INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

LIC. GUILLERMO SCHIAFFINO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS
PRESENTE

NUMERO DE SOLICITUD:	**FECHA: 07 de octubre de 2015**
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR: PUEBLA, ZACATLAN, TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA	**PERIODO: 1/10/2015 al 02/10/2015**

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:
CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT, EN EL ESTADO DE PUEBLA, LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR EL BOSQUE DE PINO AFECTADO POR EL HONGO DEL GENERO *LOPHODERMIUM.*

ACTIVIDADES REALIZADAS: EL 01 DE OCTUBRE DE 2015. SE REALIZÓ UN RECORRIDO A DIVERSAS ÁREAS AFECTADAS POR EL HONGO DEL GENERO *LOPHODERMIUM,* QUE DEFOLIAN LAS ACICULAS DE LOSPINOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN DEL ESTADO DE PUEBLA DONDE EL PRINCIPAL HOSPEDANTE ES *PINUS PSEUDOSTROBUS* VAR. *OAXACANA* Y *PINUS PATULA*. ASÍ COMO POR AQUELLAS ÁREAS DEL EJIDO CASCADAS DE TULIMAN EN LAS CUALES SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE ACUERDO A LAS NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA SEMARNAT, CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LAS ÁREAS DE AFECTACIÓN. EN ESTE EJIDO SE OBSERVÓ LA PRESENCIA DEINSECTOS DE LAS ESPECIES Pityophthorus sp, Dendroctonus sp Y UN HONGO DEL GÉNERO *Armillaria* EN ESTE RECORRIDO PARTICIPÓ PERSONAL TÉCNICO DE LA SEMARNAT DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA Y DE OFICINAS CENTRALES, Y AUTORIDADES DEL LA LOCALIDAD.
EN ESTAS ÁREAS SE OBSERVÓ GRAN CANTIDAD DE ARBOLADO AMARILLENTO Y ROJIZO AFECTADO POR EL HONGO DEL GENERO *LOPHODERMIUM* EL CUAL EL DAÑO YA ESTÁ MUY AVANZADO POR ESTE HONGO, EN ESTAS ÁREAS NO SE OBSERVÓ LA PRESENCIA DE NINGUN CHUPADOR O SALIBAZO (OCOAXO) QUE ES OTRODE LOS AGENTES QUE SE CONSIDERA ESTAR ASOCIADO CON LA PROBLEMÁTICA REFERIDA.

POR OTRA PARTE EL 02 DE OCTUBRE DE 2015SE REALIZÓ UNA VISITA EL EJIDO DE XONOCUAUTLA DEL ESTADO DE PUEBLA, DONDE SE OBSERVÓLA PRESENCIA DEL HONGO DEL GENERO *LOPHODERMIUM* QUE AFECTA LAS ACÍCULAS DEL PINO Y EN DONDE EL DAÑO SE OBSERVÓ DE MANERA INCIPIENTE SOBRE EL HOSPEDANTE ES *Pinus Montezumae* Y DONDE SE PUDO OBSERVAR LA PRESENCIA DEL INSECTO CHUPADOR CONOCIDO COMO SALIBAZO (OCUAXO) EN FORMA DE NINFA PERO POR LA POCA PRESENCIA Y POR NO HABERSE OBSERVADO EN LOS ÁRBOLES DE PINO SE ASEVERA QUE EL RESPONSABLE PRINCIPAL DEL DAÑO SIGUE ES EL HOGO DEL GÉNERO *LOPHODERMIUM* POR LO QUE RECOMENDÓ QUE SE SIGAN REALIZANDO LAS ACCIONES DE REJUNTE Y QUEMA DEL OCOCAL PARA BAJAR LA INCIDENCIA DEL INÓCULO DEL HONGO.

CONCLUSIONES:
CONTINUAR REALIZANDO LAS ACCIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS EN LAS NOTIFICACIONES DE SANEAMIENTO
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO DE LAS ÁREAS AFECTADASFALTANTES POR PARTE DE LA CONAFOR.
CONTINUAR PRESENTANDO LOS INFORMES TÉCNICOS FITOSANITARIOS PARA QUE LA SEMARNAT CONTINUE EMITIENDO LAS NOTIFICACIONES DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTES.
CONTINUAR MONITOREANDO LA PRESENCIA DE LA PLAGA PARA IR UBICANDO EL POSIBLE AVANCE DE LA MISMA.
DETECTAR LOS POSIBLES FACTORES AMBIENTALES QUE ESTÁN DETONANDO LA PRESENCIA DE ESTA PLAGA.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE SE FORMA PARTE:
LA COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL DE ACCIONESPERMITE ATENDER DE MANERA OPORTUNA LA PROBLEMÁTICA SANITARIA EN LA REGIÓN.

ATENTAMENTE

ING. OSCAR TREJO RAMÍREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORESTAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.