



OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Bitácora: 20/DS-0143/03/23

Oaxaca, Oaxaca, 10 de julio de 2023

Asunto: Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales

PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I. PROMOVENTE

Visto para resolver el expediente instaurado a nombre de PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I. en su carácter de PROMOVENTE con motivo de la solicitud de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por una superficie de 4,918.8 metros cuadrados, para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca, y

RESULTANDO

- i. Que mediante FORMATO de fecha 23 de febrero de 2023, recibido en esta Oficina de Representación el 16 de marzo de 2023, PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, presentó la solicitud de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales por una superficie de 4918.8 metros cuadrados, para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con pretendida ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca, adjuntando para tal efecto la siguiente documentación:

El promovente acompañó a su solicitud de diversa información a que se refieren los artículos 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 138 a 153 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2020 (RLGDFS).

- ii. Que mediante oficio N° SEMARNAT-AR-0404-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, esta Oficina de Representación, requirió a PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, información faltante del expediente presentado con motivo de la solicitud de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca, haciéndole la prevención que al no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, el trámite sería desechado, la cual se refiere a lo siguiente:





Del Estudio Técnico Justificativo:

1.- Del capítulo I, DESCRIPCIÓN DEL O LOS USOS QUE SE PRETENDAN DAR AL TERRENO, deberá aclarar la superficie solicitada para cambio de uso de suelo, ya que en formato FF-SEMARNAT-030 establece 4,918.799 m²; sin embargo, en página 8 del estudio técnico, refiere 2,918.799 m² objeto de solicitud.

2.- Del capítulo III, DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA, SUBCUENCA Y MICROCUENCA, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUPERFICIE SOLICITADA INCLUYENDO CLIMA, TIPOS DE SUELO, TOPOGRAFÍA, HIDROGRAFÍA, GEOLOGÍA Y LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA FLORÍSTICA POR TIPOS DE VEGETACIÓN Y COMPOSICIÓN DE GRUPOS FAUNÍSTICOS, se requiere:

a) Realizar la descripción de las corrientes superficiales identificadas dentro de la microcuenca hidrográfica, incluyendo sus flujos.

Para la vegetación:

b) Metodología de muestreo en el tipo de vegetación a afectar por el desarrollo del cambio de uso de suelo propuesto, que incluya forma y tamaño de los sitios de muestreo. Listado de sitios con coordenadas georreferenciadas. Si los sitios son circulares, presentar coordenada central; cuando sean de otra forma, presentar las coordenadas de los vértices que los delimiten.

c) Memorias de campo en electrónico

d) Listado de especies registradas por estrato, que incluya nombre científico, nombre común, categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, endemismo, número de individuos/ha

e) Análisis de diversidad por estrato, debiendo emplear No. Individuos/ha

Fauna:

f) Con base en estudios que existan para la zona, presentar la distribución potencial de la fauna

g) Metodología de muestreo por grupo faunístico

h) Listado de especies por grupo, que incluya nombre científico, nombre común, categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, endemismo, No. Individuos

i) Análisis de diversidad por grupo

j) Estacionalidad de las especies, abundancia, sociabilidad, alimentación, hábitat.

3.- En el capítulo IV, DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ÁREA SUJETA A CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, QUE INCLUYA CLIMA, TIPOS DE SUELO, PENDIENTE MEDIA, RELIEVE, HIDROGRAFÍA Y TIPOS DE VEGETACIÓN Y DE FAUNA, deberá presentar:





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

a) Estimación de la erosión en el área solicitada para cambio de uso de suelo bajo condiciones actuales, y en el supuesto de ejecutarse el cambio de uso de suelo.

b) Estimación de la infiltración en el área solicitada para cambio de uso de suelo bajo condiciones actuales, y luego de ejecutarse el cambio de uso de suelo solicitado.

Elementos biológicos:

Vegetación.

c) Análisis estadístico que justifique el tamaño de muestra empleado.

d) Metodología que incluya forma y tamaño de los sitios de muestreo. Listado de sitios con coordenadas georreferenciadas. Si los sitios son circulares, presentar coordenada central; cuando sean de otra forma, presentar las coordenadas de los vértices que los delimiten.

e) Memorias de campo en electrónico

f) Listado de especies registradas por estrato, que incluya nombre científico, nombre común, categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, endemismo, número de individuos/ha

g) Análisis de diversidad por estrato, debiendo emplear No. Individuos/ha

Fauna:

h) Con base en estudios que existan para la zona, presentar la distribución potencial de la fauna

i) Metodología de muestreo por grupo faunístico

j) Listado de especies por grupo, que incluya nombre científico, nombre común, categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, endemismo, No. Individuos

k) Análisis de diversidad por grupo

l) Estacionalidad de las especies, abundancia, sociabilidad, alimentación, hábitat.

4.- Del capítulo V, UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y FAUNÍSTICA DEL ÁREA SUJETA A CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CON RELACIÓN A LOS TIPOS DE VEGETACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LA CUENCA, SUBCUENCA O MICROCUENCA HIDROGRÁFICA, QUE PERMITA DETERMINAR EL GRADO DE AFECTACIÓN POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, se requiere:

a) Listado comparativo de especies por estrato de vegetación, incluyendo índices de diversidad. Se sugiere emplear índices de similitud o complementariedad.

b) Rectificar o ratificar la información faunística presentada.





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

5.- En el capítulo VI, UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TASAS DE EROSIÓN DE LOS SUELOS, ASÍ COMO LA CALIDAD, CAPTACIÓN E INFILTRACIÓN DEL AGUA, EN EL ÁREA SOLICITADA RESPECTO A LAS QUE SE TENDRÍAN DESPUÉS DE LA REMOCIÓN DE LA VEGETACIÓN FORESTAL, deberá presentar:

Erosión

Erosión hídrica

a) Análisis de erosión en el área solicitada para cambio de uso de suelo en condiciones actuales de cobertura vegetal, y una vez ejecutado el cambio de uso de suelo. Realizar la estimación de la erosión que se presentaría durante el tiempo que el suelo permanezca desnudo; ello para conocer la cantidad de suelo a compensar con las medidas propuestas.

b) Análisis de erosión que se presenta en el polígono de reubicación de especies en condiciones actuales de cobertura vegetal y una vez realizada la reubicación; de tal manera que se demuestre que se recuperará la cantidad de suelo estimado en el apartado anterior.

Erosión eólica

c) Análisis de erosión en el área solicitada para cambio de uso de suelo en condiciones actuales de cobertura vegetal, y una vez ejecutado el cambio de uso de suelo. Realizar la estimación de la erosión que se presentaría durante el tiempo que el suelo permanezca desnudo; ello para conocer la cantidad de suelo a compensar con las medidas propuestas.

d) Análisis de erosión que se presenta en el polígono de reubicación de especies en condiciones actuales de cobertura vegetal y una vez realizada la reubicación; de tal manera que se demuestre que se recuperará la cantidad de suelo estimado en el apartado anterior.

Infiltración

e) Análisis de infiltración en el área solicitada para cambio de uso de suelo en condiciones actuales de cobertura vegetal, y una vez ejecutado el cambio de uso de suelo. Realizar la estimación la cantidad de agua que dejaría de infiltrarse durante el tiempo que el suelo permanezca desnudo; ello para conocer la cantidad de agua a compensar con las medidas propuestas.

f) Análisis de la infiltración que se presenta en el polígono de reubicación de especies en condiciones actuales de cobertura vegetal y una vez realizada la reubicación; de tal manera que se demuestre que se recuperará la cantidad de agua estimada en el apartado anterior.

g) Medidas de mitigación y/o compensación para la cantidad de suelo que se erosionaría y agua que dejaría de infiltrarse por el tiempo que dure desnudo el suelo por la ejecución del proyecto.

6.- Para el capítulo VII, ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN EN METROS CÚBICOS, POR ESPECIE Y POR PREDIO, DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES DERIVADAS DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO, se requiere:

a) Aclarar la variable empleada para la estimación del error de muestreo.

b) Corroborar y en su caso, su estimación de error de muestreo.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

c) Corroborar y en su caso, corregir la fórmula empleada para estimar el tamaño de muestra; deberá incluir memoria de cálculo en electrónico. Dado que en su estimación resultan cuatro sitios de muestreo, deberá justificar la realización de 3.

7.- Del capítulo XII, ANÁLISIS QUE DEMUESTREN QUE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO SE MANTENGA:

a) Con los índices de diversidad estimados en capítulos III y IV, deberá realizar un análisis comparativo que demuestre que se mantenga la biodiversidad de flora. En su análisis deberá considerar también índices de similitud o complementariedad, así como las medidas de mitigación y/o compensación establecidas en capítulo X del estudio técnico.

b) Con los índices de diversidad estimados en capítulos III y IV, deberá realizar un análisis comparativo que demuestre que se mantenga la biodiversidad de flora. En su análisis deberá considerar también índices de similitud o complementariedad, aspectos de las especies como estacionalidad, sociabilidad, alimentación, etc., así como las medidas de mitigación y/o compensación establecidas en capítulo X del estudio técnico.

De la documentación legal:

1.- Una manifestación bajo protesta de decir verdad, si ya se realizó el cambio del uso del suelo en el predio que solicita para llevar a cabo el proyecto de Extracción de Material Pétreo Banco RHIA GUATZINA; toda vez, que se advierte de las coordenadas que presenta, que junto al polígono que solicita para el cambio de uso de suelo, existe una área impactada.

- iii. Que mediante ESCRITO SIN NUMERO de fecha 20 de abril de 2023, recibido en esta Oficina de Representación el día 25 de abril de 2023, PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, remitió la información faltante que fue solicitada mediante oficio N°SEMARNAT-AR-0404-2023 de fecha 30 de marzo de 2023, la cual cumplió con lo requerido.
- iv. Que mediante oficio N° CEF-CCF-049/2023 de fecha 17 de abril de 2023 recibido el 28 de abril de 2023, esta Oficina de Representación, requirió opinión al Consejo Estatal Forestal sobre la viabilidad para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con ubicación en el o los municipio(s) Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca.
- v. Que mediante oficio ESCRITO SIN NUMERO de fecha 28 de abril de 2023, recibido en esta Oficina de Representación el día 28 de abril de 2023, el Consejo Estatal Forestal envió la opinión técnica de la solicitud de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca donde se desprende lo siguiente:





De la opinión del Consejo Estatal Forestal

No existe inconveniente por parte de los integrantes de la Comisión, a efecto de que la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado emita la autorización solicitada.

VI. Que mediante oficio N° SEMARNAT-AR-0617-2023 de fecha 11 de mayo de 2023 esta Oficina de Representación notificó a PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I. en su carácter de PROMOVENTE que se llevaría a cabo la visita técnica al o los predios sujetos a cambio de uso de suelo en terrenos forestales del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"** con pretendida ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca atendiendo lo siguiente:

- Que la superficie, ubicación y delimitación geográfica, así como el tipo de vegetación forestal a afectar con el cambio de uso de suelo corresponda con lo manifestado en el estudio técnico justificativo.
- Que las coordenadas UTM que delimitan el área solicitada para cambio de uso de suelo correspondan a las manifestadas en el estudio técnico justificativo.
- Que la estimación de volúmenes por especie de las materias primas forestales que serán removidas por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales correspondan con lo manifestado en el estudio técnico justificativo.
- Que no se afecten cuerpos de agua permanentes y recursos asociados por la ejecución del proyecto, en caso contrario informar el nombre y ubicación de éstos.
- Que los servicios ambientales que resultarán afectados con el cambio de uso de suelo correspondan con lo manifestado en el estudio técnico justificativo.
- El estado de conservación de la vegetación que será removida por el cambio de uso de suelo, precisando si corresponde a vegetación primaria o secundaria y si ésta se encuentra en proceso de recuperación, en proceso de degradación o en buen estado de conservación.
- Si existen especies de flora y fauna silvestres en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010, que no hayan sido consideradas en el estudio técnico justificativo, reportar el nombre común y científico de éstas.
- Si las medidas de prevención y mitigación de los impactos sobre los recursos forestales, agua, suelo y biodiversidad contempladas para el desarrollo del proyecto son las adecuadas.

VII. Que derivado de la visita técnica al o los predios sujetos a cambio de uso de suelo en terrenos forestales realizada por el personal técnico de la Oficina de Representación y de acuerdo al respectivo reporte de campo, se observó lo siguiente:

Del informe de la Visita Técnica

- Respecto de la superficie y ubicación del proyecto, se informa que se verificaron las coordenadas que delimitan el polígono solicitado para cambio de uso de suelo, coincidiendo con las reportadas en el Estudio técnico.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

- En relación al tipo de vegetación a afectar por el desarrollo del proyecto, ésta corresponde a primaria de Bosque de pino encino en buen estado de conservación.
 - Respecto de los volúmenes de remoción estimados por la ejecución del proyecto, se menciona que se verificaron sitios de muestreo al interior del área solicitada para cambio de uso de suelo, corroborando alturas y diámetros, lo cual permite inferir que la estimación de volúmenes es correcta.
 - En el polígono solicitado para cambio de uso de suelo, no existen corrientes de carácter permanente o temporal.
 - Al momento de la visita, no se observó remoción de vegetación en el área solicitada para cambio de uso de suelo.
 - Respecto de la ocurrencia de incendios, se indica que no se detectó evidencia de afectación por incendios forestales
 - Durante la visita, no se observaron especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
 - Los servicios ambientales que resultarán afectados sí corresponden con lo manifestado en el estudio técnico.
 - Sobre las medidas de prevención y mitigación de los impactos sobre la biodiversidad, agua y suelo, se considera que éstas son adecuadas y en su caso, deberá recalcarse su cabal cumplimiento en el resolutivo a emitir.
- viii. Que mediante oficio N° SEMARNAT-AR-0725-2023 de fecha 30 de mayo de 2023, esta Oficina de Representación, con fundamento en los artículos 2 fracción I, 3 fracción II, 7 fracción XXVIII, 10 fracción XXX, 14 fracción XI, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 139, 140 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 139, 141, 143, 144 y 152 de su Reglamento; en los Acuerdos por los que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, los criterios técnicos y el método que deberá observarse para su determinación y en los costos de referencia para la reforestación o restauración y su mantenimiento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2005 y 08 de marzo de 2023 respectivamente, notificó a PROCESADORA DE AGREGADOS PETRÉOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I. en su carácter de PROMOVENTE, que como parte del procedimiento para expedir la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, debería depositar ante el Fondo Forestal Mexicano, la cantidad de **\$106,735.76 (ciento seis mil setecientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.)**, por concepto de compensación ambiental para ser destinados a las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 1.82 hectáreas con vegetación de Bosque de pino-encino, preferentemente en el estado de Oaxaca.
- ix. Que mediante ESCRITO SIN NUMERO de fecha 27 de junio de 2023, recibido en esta Oficina de Representación el día 27 de junio de 2023, PROCESADORA DE AGREGADOS PETRÉOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I. en su carácter de PROMOVENTE, notificó haber realizado el depósito al Fondo Forestal Mexicano por la cantidad de **\$ 106,735.76 (ciento seis mil setecientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.)** por concepto de compensación ambiental para ser destinados a las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 1.82 hectáreas con vegetación de Bosque de pino-encino, preferentemente en el estado de Oaxaca.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Que con vista en las constancias y actuaciones de procedimiento arriba relacionadas, las cuales obran agregadas al expediente en que se actúa; y

CONSIDERANDO

- I. Que esta Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es competente para dictar la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 35 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- II. Que la vía intentada por el interesado con su escrito de mérito, es la procedente para instaurar el procedimiento de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, conforme a lo establecido en los artículos 10 fracción XXX, 14 fracción XI, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como de los artículos 139, 141, 143, 144 y 152 de su Reglamento.
- III. Que con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de solicitud establecidos por los artículos 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 139 y 141 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, esta Unidad Administrativa se avocó a la revisión de la información y documentación que fue proporcionada por el promovente, mediante sus escritos de solicitud y subsecuentes, considerando lo siguiente:

1.- Por lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos de solicitud establecidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafos segundo y tercero, esta disposición establece:

Artículo 15...

Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital.

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.

Con vista en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que los requisitos previstos por el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafo segundo y tercero fueron satisfechos mediante FORMATO de fecha 23 de Febrero de 2023, el cual fue signado por PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, dirigido al titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual solicita la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por una superficie de 4918.8 metros cuadrados, para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTRICO BANCO RHIA GUATZINA"**, con pretendida ubicación en el municipio o los municipio(s) de





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca.

2.- Por lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos de solicitud establecidos en el artículo 139 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS), que dispone:

Artículo 139. Para solicitar la autorización de Cambio de uso del suelo en Terrenos forestales, el interesado presentará la solicitud mediante el formato que para tal efecto expida la Secretaría, el cual deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I. Nombre o denominación o razón social, así como domicilio, número telefónico y correo electrónico del solicitante;

II. Lugar y fecha;

III. Datos de ubicación del predio o Conjunto de predios, y

IV. Superficie forestal solicitada para el Cambio de uso de suelo y el tipo de vegetación por afectar identificada conforme a la Clasificación del Uso de Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se deberá anexar lo siguiente:

I. Copia simple de la identificación oficial del solicitante;

II. Original o copia certificada del instrumento con el cual se acredite la personalidad del representante legal o de quien solicite el Cambio de uso de suelo a nombre del propietario o poseedor del predio, así como copia simple para su cotejo;

III. Original o copia certificada del título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del documento que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen el Cambio de uso del suelo en Terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo;

IV. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia certificada del acta de asamblea de conformidad con la Ley Agraria en la que conste el acuerdo de Cambio del uso del suelo en el terreno respectivo, y

V. El estudio técnico justificativo, en formato impreso y electrónico o digital.

Con vista en las constancias que obran en el expediente, se advierte que los requisitos previstos por el artículo 139, párrafo primero del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, éstos fueron satisfechos mediante la presentación del formato de solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales FF-SEMARNAT-030, debidamente requisitado y firmado por el interesado, donde se asientan los datos que dicho párrafo señala.

Por lo que corresponde al requisito establecido en el citado artículo 139 fracción V del RLGDFS, consistente en presentar el estudio técnico justificativo del proyecto en cuestión, éste fue satisfecho mediante el documento denominado estudio técnico justificativo que fue exhibido por el





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

interesado adjunto a su solicitud de mérito, el cual se encuentra firmado por PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, así como por ESIMAVISI ECOLOGIA SILVICULTURA Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE SA DE CV en su carácter de responsable técnico de la elaboración del mismo, quien se encuentra inscrito en el Registro Forestal Nacional como prestador de servicios técnicos forestales en el Lib. OAX T-VI Vol. 3 Núm. 24.

Por lo que corresponde al requisito previsto en el citado artículo 139 fracciones III y IV del RLGDFS, consistente en presentar original o copia certificada del título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del documento que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, éstos quedaron satisfechos en el presente expediente con los siguientes documentos:

- Sentencia definitiva de fecha 16 de mayo de 1995, pronunciada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 21 dentro del expediente 50/95 en la vía de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado denominado CAPULALPAM DE MÉNDEZ, Municipio de su mismo nombre, Distrito de Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca; en la cual en su punto resolutivo SEGUNDO se reconoce y titula a favor del poblado de referencia una superficie total de 3,843-15-52.59 hectáreas (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES HECTÁREAS, QUINCE ÁREAS, CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y NUEVE ÁREAS); misma que le sirve a la comunidad como título de propiedad para todos los efectos legales.

- Acta de Ejecución de fecha 23 de octubre de 1995, de la superficie reconocida y titulada a la comunidad de Capulalpam de Méndez, Municipio de su mismo nombre, Distrito de Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la Sentencia definitiva de fecha 16 de mayo de 1995; en la cual se describe una superficie de 3,788-33-72 hectáreas (TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO HECTÁREAS, TREINTA Y TRES ÁREAS, Y SETENTA Y DOS CENTIÁREAS).

- Plano Definitivo de la superficie reconocida a la comunidad de Capulalpam de Méndez, Municipio de su mismo nombre, Distrito de Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca.

- Primera convocatoria de fecha 28 de enero de 2023 y Acta de Asamblea General de Comuneros de fecha 12 de febrero de 2023, de la comunidad de Capulalpam de Méndez, Municipio de su mismo nombre, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en la cual en su punto CUARTO se autoriza a la empresa PROCESADORA DE AGREGADOS PÉTREOS RHIA GUATZINA, S.P.R. de R.I., realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 4,918.799 metros cuadrados.

Por lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos de contenido del estudio técnico justificativo, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 141 del RLGDFS, que dispone:

Artículo 141. Los estudios técnicos justificativos a que se refiere el artículo 93 de la Ley, deberán contener, por lo menos, lo siguiente:

I. Descripción del o los usos que se pretendan dar al terreno;

II. Ubicación y superficie total del o los polígonos donde se pretenda realizar el Cambio de uso del suelo en los Terrenos forestales, precisando su localización geográfica en los planos del predio correspondiente, los cuales estarán georeferenciados y expresados en coordenadas UTM;





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

- III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la Cuenca hidrográfica, subcuenca y microcuenca, donde se encuentra ubicada la superficie solicitada incluyendo clima, tipos de suelo, topografía, hidrografía, geología y la composición y estructura florística por tipos de vegetación y composición de grupos faunísticos;
- IV. Descripción de las condiciones del área sujeta a Cambio de uso de suelo en Terrenos forestales, que incluya clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de fauna;
- V. Un análisis comparativo de la composición florística y faunística del área sujeta a Cambio de uso de suelo en Terrenos forestales con relación a los tipos de vegetación del ecosistema de la cuenca, subcuenca o microcuenca hidrográfica, que permita determinar el grado de afectación por el Cambio de uso de suelo en Terrenos forestales;
- VI. Un análisis comparativo de las tasas de erosión de los suelos, así como la calidad, captación e infiltración del agua, en el área solicitada respecto a las que se tendrían después de la remoción de la Vegetación forestal;
- VII. Estimación del volumen en metros cúbicos, por especie y por predio, de las Materias primas forestales derivadas del Cambio de uso del suelo;
- VIII. Plazo propuesto y la programación de las acciones para la ejecución del Cambio de uso de suelo;
- IX. Propuesta de programa de rescate y reubicación de especies de flora y fauna que pudieran resultar afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, en caso de autorizarse el Cambio de uso de suelo;
- X. Medidas de prevención y mitigación por la afectación sobre los Recursos forestales, el suelo, el agua, la flora y fauna silvestres aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del Cambio de uso de suelo;
- XI. Servicios ambientales que serán afectados por el Cambio de uso de suelo propuesto;
- XII. Análisis que demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados por el Cambio del uso de suelo se mantenga;
- XIII. Datos de inscripción en el Registro del Prestador de Servicios forestales que haya elaborado el estudio, y del que estará a cargo de la ejecución del Cambio de uso de suelo;
- XIV. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes categorías, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables, y
- XV. Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones jurídicas.

La propuesta de programa a que se refiere la fracción IX del presente artículo deberá incluir el nombre de las especies a rescatar, la densidad de plantación, el Plano georeferenciado del sitio





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

donde serán reubicadas dentro del ecosistema afectado, preferentemente en áreas vecinas o cercanas a donde se realizarán los trabajos de Cambio de uso de suelo, así como las acciones que aseguren al menos un ochenta por ciento de supervivencia de las referidas especies, los periodos de ejecución de dichas acciones y de su mantenimiento.

Para efectos de lo previsto en la fracción XIV del presente artículo, los interesados identificarán los criterios de los programas de ordenamiento ecológico que emitan las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, atendiendo al uso que se pretende dar al Terreno forestal.

Con vista en las constancias que obran en el expediente, se advierte que los requisitos previstos por el artículo 141 del RLGDFS, fueron satisfechos por el interesado en la información vertida en el estudio técnico justificativo entregado en esta Oficina de Representación, mediante FORMATO y la información faltante con ESCRITO SIN NUMERO, de fechas 23 de Febrero de 2023 y 20 de Abril de 2023, respectivamente.

Por lo anterior, con base en la información y documentación que fue proporcionada por el interesado, esta autoridad administrativa tuvo por satisfechos los requisitos de solicitud previstos por los artículos 139 y 141 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como la del artículo 15, párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

- IV. Que con el objeto de resolver lo relativo a la demostración de los supuestos normativos que establece el artículo 93, párrafo primero, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de cuyo cumplimiento depende la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales solicitada, esta autoridad administrativa se avocó al estudio de la información y documentación que obra en el expediente, considerando lo siguiente:

El artículo 93, párrafo primero, de la LGDFS, establece:

ARTÍCULO 93. La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el Reglamento, los cuales demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, la capacidad de almacenamiento de carbono, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.

De la lectura de la disposición anteriormente citada, se desprende que a esta autoridad administrativa sólo le está permitido autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, cuando el interesado demuestre a través de su estudio técnico justificativo, que se actualizan los supuestos siguientes:

1. Que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga,
2. Que la erosión de los suelos se mitigue,
3. Que la capacidad de almacenamiento de carbono se mitigue y
4. Que el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitigue.





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

obtusata, Quercus crassifolia, Pinus pseudostrobus, Quercus laurina y Cornus excelsa.

Análisis de similitud

Se realizó también el análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard, el cual sirve para expresar el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas. El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, cuando no hay especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones tienen la misma composición de especies.

El resultado muestra que el estrato arbóreo de Bosque de Pino-Encino de la microcuenca delimitada y predio son similares en más del 29% de composición de especies.

Índices de diversidad

Adicionalmente, se muestra el análisis de los índices de diversidad estimados para microcuenca y área del proyecto, para el estrato arbóreo:

Indice	Microcuenca	CUSFT
Riqueza específica (S)=	12	10
Índice de Margalef (Dmg)=	1.5206	1.2779
Índice de Simpson (D)=	0.1214	0.2242
Diversidad de Simpson (1-D)=	0.8786	0.7758
Índice de Shannon-Wiener (H')=	2.2527	1.7612
Máxima diversidad (Hmax)=	2.4849	2.3026
Equidad de Pielou (J') =	0.9066	0.7649
Hmax - H =	0.2322	0.5413

Los resultados muestran que tanto riqueza de especies como índices de diversidad son mayores en la microcuenca delimitada, a excepción de D, en relación a lo que se encontró en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo.

Relacionado a la riqueza de especies, está el Índice de Margalef, el cual al tomar valores menores a 2 en ambas comunidades indica una baja riqueza, (Dmg= 1.5206 MHF vs 1.2779 CUS).

El Índice de Simpson, al ser indicador de dominancia, al ser cercano a 0, indica baja dominancia, o alta uniformidad en cuanto a la representatividad de las especies, la cual es más evidente en el predio, aunque no con mucha diferencia de la microcuenca delimitada.

El índice de Shannon-Wiener contempla tanto la riqueza de especies, como el número de individuos de cada especie (su abundancia) y en el caso del estrato arbóreo, ambas comunidades pueden ser consideradas poco diversas, al poseer valores menores a 3 (H'= 2.2527 MHF vs 1.7612 CUS).

Por otro lado, el valor de J' indica que las especies del área solicitada para cambio de uso de suelo se encuentran menos homogéneamente representados, en cuanto a número de individuos que las representan, en comparación con la microcuenca delimitada en donde hay más igualdad de abundancia.

Sin embargo, a continuación, se presenta el análisis del índice de valor de importancia, el cual





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

En tal virtud, con base en el análisis de la información técnica proporcionada por el interesado, se entra en el examen de los cuatro supuestos arriba referidos, en los términos que a continuación se indican:

1. Por lo que corresponde al **primero de los supuestos**, referente a la obligación de demostrar que **la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga**, se observó lo siguiente:

Del estudio técnico justificativo se desprende información contenida en diversos apartados del mismo, consistente en que:

Vegetación de la Microcuenca

INEGI reporta para el área del proyecto bosque de pino-encino, el cual ocupa 328.59 ha de la cuenca hidrológico forestal (MHF) delimitada, representando el 86.55% de los usos de suelo y tipos de vegetación presentes en ella.

De los recorridos de campo se corroboró que el tipo de vegetación a afectar por el desarrollo del proyecto corresponde a Bosque de pino encino.

Con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, principalmente el demostrar que no se compromete la Biodiversidad al realizar el cambio de uso de suelo en el área solicitada para el proyecto en comento, se realizó lo siguiente:

Con la información recabada durante los muestreos de campo, tanto en la microcuenca como en el área del proyecto, se calcularon los atributos de los índices de diversidad por especie de la vegetación de Bosque de pino - encino y de esta manera se obtuvo el índice de dominancia relativa o valor de importancia ecológica, el cual nos indica la relevancia y nivel de ocupación del sitio de una especie con respecto a las demás en función de su frecuencia, distribución y dimensión de dichos individuos.

Los resultados de dichos análisis se muestran a continuación.

FLORA

Estrato arbóreo

Composición

El estrato arbóreo de la MHF presentó una riqueza de 12 especies, de las cuales 7 se encontraron únicamente en esa área; es decir, fueron de aparición o registro exclusivo de la MHF: *Prunus serótina*, *Garrya laurifolia*, *Arbutus xalapensis*, *Ternstroemia sylvatica*, *Pinus patula*, *Pinus douglasiana* y *Clusia quadrangula*, ninguna de éstas se afectará por el desarrollo del proyecto.

En cuanto a la zona del proyecto, se registraron diez especies en este estrato, de las cuales cinco fueron de aparición exclusiva en el área de CUS: *Verbesina turbacensis*, *Baccharis conferta*, *Alnus acuminata*, *Baccharis heterophylla* y *Diphysa carthagenensis*.

Finalmente, cinco especies se observaron tanto en MHF como el área de CUS: *Quercus*





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

aunado a la composición de especies nos permitirá determinar si éstas corresponden a vegetación primaria y/o de importancia ecológica que las haga susceptibles de rescate y reubicación y con ello, no comprometer su permanencia dentro del ecosistema de Bosque de Pino-Encino.

Índice de Valor de Importancia

Se realizó el análisis del Índice de Valor de Importancia (IVI), cuyos resultados se muestran a continuación.

Nombre común	Nombre científico	MHF	CUSTF
Encino hoja delgada	<i>Quercus obtusata</i>	38.9946	42.5099
Encino hoja ancha	<i>Quercus crassifolia</i>	24.9947	16.9308
Tabaquillo	<i>Verbesina turbacensis</i>	-	5.5721
Chamizo chino	<i>Baccharis conferta</i>	-	19.7486
Pseudostrobus	<i>Pinus pseudostrobus</i>	47.6996	129.6821
Laurina	<i>Quercus laurina</i>	30.5108	39.9359
Palo de águila	<i>Alnus acuminata</i>	-	5.6592
Chamizo 2	<i>Baccharis heterophylla</i>	-	5.5967
Hoja de sierra	<i>Prunus serotina</i>	5.3830	-
Hoja nanche	<i>Garrya laurifolia</i>	12.5870	-
Madroño	<i>Arbutus xalapensis</i>	29.8552	-
Tila	<i>Ternstroemia sylvatica</i>	15.1491	-
Pino patula	<i>Pinus patula</i>	34.1061	-
Pino douglasiana	<i>Pinus douglasiana</i>	32.0921	-
Hoja pinta	<i>Clusia quadrangula</i>	4.5517	-
Morita azul	<i>Cornus excelsa</i>	24.0762	19.8501
Hoja pinada	<i>Diphysa carthagenensis</i>	-	14.5146

Como se observa en tabla anterior, la especie con mayor IVI en la microcuenca corresponde a *Pinus pseudostrobus*, con IVI= 47.70; seguida de *Quercus obtusata*, con IVI= 38.99. La primera especie nativa y la segunda endémica, ambas con importancia cultural.

El área del proyecto comparte estas mismas especies con mayor índice de valor de importancia: *Pinus pseudostrobus*, con IVI= 129.68; seguida de *Quercus obtusata*, con IVI= 42.51, lo cual supone que su eliminación por la ejecución del proyecto no compromete su permanencia dentro del ecosistema de Bosque de Pino-Encino.

Como se observa, en la microcuenca delimitada tanto la riqueza como índices de diversidad resultaron mayores en comparación con los valores del predio, lo cual demuestra que la eliminación de vegetación por el cambio de uso de suelo solicitado, no pone en riesgo la diversidad de la vegetación del estrato arbóreo propia del Bosque de Pino-Encino.

Estrato arbustivo

Composición

El estrato arbustivo de la microcuenca presentó una riqueza de 12 especies, de las cuales 5 se registraron únicamente en ella: *Garrya laurifolia*, *Monnina xalapensis*, *Arbutus xalapensis*, *Ternstroemia sylvatica* y *Oncidium hastatum*. Ninguna de estas especies será afectada por la





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

ejecución del cambio de uso de suelo solicitado.

En relación al área del proyecto, se registraron 11 especies en el estrato, 4 de ellas de aparición o registro exclusivo: *Quercus obtusata*, *Baccharis conferta*, *Pinus pseudostrobus* y *Rhus terebinthifolia*.

Finalmente, siete especies se registraron tanto en la microcuencia como en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo: *Quercus laurina*, *Roldana oaxacana*, *Prunus serótina*, *Salix paradox*, *Amelanchier denticulata*, *Acacia angustissima* y *Cornus excelsa*.

Análisis de similitud

El análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard muestra que la vegetación del estrato arbustivo de Bosque de Pino-Encino de la microcuencia delimitada y el predio son similares en más del 43% de composición de especies.

Índices de diversidad

Índice	Microcuencia	CUSTF
Riqueza específica (S)=	12	11
Índice de Margalef (Dmg)=	1.2613	1.1687
Índice de Simpson (D)=	0.1588	0.1519
Diversidad de Simpson (1-D)=	0.8412	0.8481
Índice de Shannon-Wiener (H')=	2.1079	2.0829
Máxima diversidad (Hmax)=	2.4849	2.3979
Equidad de Pielou (J') =	0.8483	0.8686
Hmax - H' =	0.3770	0.3150

Los resultados muestran que tanto riqueza de especies como índices de diversidad son mayores en la microcuencia delimitada, en relación a lo que se encontró en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo.

Relacionado a la riqueza de especies, está el Índice de Margalef, el cual al tomar valores menores a 2 en ambas comunidades (Dmg= 1.2613 MHF vs 1.1687 CUS) indica una baja riqueza de especies.

El Índice de Simpson, al ser indicador de dominancia, al ser cercano a 0, indica baja dominancia, o alta uniformidad en cuanto a la representatividad de las especies, la cual es parecida en la microcuencia delimitada y el predio.

El índice de Shannon-Wiener contempla tanto la riqueza de especies, como el número de individuos de cada especie (su abundancia) y en el caso del estrato arbustivo, ambas comunidades pueden ser consideradas poco diversas, al poseer valores menores a 3 (H'= 2.1079 MHF vs 2.0829 CUS).

Por otro lado, el valor de J' indica que las especies de la microcuencia delimitada y del área solicitada para cambio de uso de suelo se encuentran homogéneamente representados, en cuanto a número de individuos que las representan.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el análisis de abundancia relativa de las especies, el





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

cual aunado a la composición de especies nos permitirá determinar si éstas corresponden a vegetación primaria y/o de importancia ecológica que las haga susceptibles de rescate y reubicación y con ello, no comprometer su permanencia dentro del ecosistema.

Abundancia relativa

Nombre común	Especie	AR Microcuenca	AR CUSTF
Encino hoja delgada	<i>Quercus obtusata</i>	-	2.56
Chamizo chino	<i>Baccharis conferta</i>	-	5.13
Pseudostrobus	<i>Pinus pseudostrobus</i>	-	10.26
Laurina	<i>Quercus laurina</i>	2.17	2.56
Hoja estrella	<i>Roldana oaxacana</i>	23.91	20.51
Hoja de sierra	<i>Prunus serotina</i>	8.70	2.56
Hoja gamusa	<i>Salix paradox</i>	6.52	23.08
Hoja circular	<i>Amelanchier denticulata</i>	2.17	7.69
Hoja nanche	<i>Garrya laurifolia</i>	6.52	-
Hoja chinita	<i>Monnina xalapensis</i>	2.17	-
Hoja acolchada	<i>Rhus terebinthifolia</i>	-	5.13
Timbre	<i>Acacia angustissima</i>	2.17	2.56
Madroño	<i>Arbutus xalapensis</i>	4.35	-
Tila	<i>Ternstroemia sylvatica</i>	4.35	-
Oreja	<i>Oncidium hastatum</i>	10.87	-
Morita azul	<i>Cornus excelsa</i>	26.09	17.95

La especie con mayor abundancia relativa en la microcuenca delimitada es *Cornus excelsa* (AR= 26.09 %), seguida de *Roldana oaxacana* (AR= 23.91 %), y *Oncidium hastatum*, con AR= 10.87 %; el resto de las especies tiene porcentajes menores a 10.

En relación al área solicitada para cambio de uso de suelo, *Salix paradox* con AR= 23.08 %, es la especie con mayor porcentaje de abundancia, seguida de *Roldana oaxacana* (AR=20.51 %), *Cornus excelsa* (AR=17.95 %) y *Pinus pseudostrobus* con AR= 10.26 %.

Como se observa, en la microcuenca delimitada tanto la riqueza como índices de diversidad resultaron mayores en comparación con los valores del predio, lo cual demuestra que la eliminación de vegetación por el cambio de uso de suelo solicitado, no pone en riesgo la diversidad de la vegetación propia del estrato arbustivo del Bosque de Pino-Encino.

Estrato herbáceo

Composición

Como se muestra en la tabla siguiente, el estrato herbáceo de la microcuenca presentó una riqueza de 10 especies, de las cuales siete se registraron únicamente en ella: *Acacia angustissima*, *Tournefortia hirsutissima*, *Chimaphila maculata*, *Passiflora foetida*, *Castilleja arvensis*, *Lobelia laxiflora* y *Cornus excelsa*. Ninguna de estas especies será afectada por la ejecución del cambio de uso de suelo solicitado.

En relación al área del proyecto, se registraron 7 especies en el estrato, cuatro de ellas de aparición o registro exclusivo: *Prunus serotina*, *Ageratina petiolaris*, *Garrya laurifolia* y *Lasiacis ruscifolia*.





Finalmente, tres especies se registraron tanto en la microcuenca como en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo: *Roldana oaxacana*, *Desmodium uncinatum* y *Monnina xalapensis*.

Análisis de similitud

El análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard indica que el estrato herbáceo de Bosque de Pino-Encino de la microcuenca delimitada y el predio son similares 21%, en cuanto a composición de especies.

Índices de diversidad

Índice	Microcuenca	CUSTF
Riqueza específica (S)=	10	7
Índice de Margalef (Dmg)=	0.8234	0.5925
Índice de Simpson (D)=	0.2092	0.2867
Diversidad de Simpson (1-D)=	0.7908	0.7133
Índice de Shannon-Wiener (H')=	1.8653	1.5340
Máxima diversidad (Hmax)=	2.3026	1.9459
Equidad de Pielou (J') =	0.8101	0.7883
Hmax - H' =	0.4373	0.4119

Los resultados muestran que tanto riqueza de especies como índices de diversidad son mayores en la microcuenca delimitada, a excepción de D, en relación a lo que se encontró en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo.

Relacionado a la riqueza de especies, está el Índice de Margalef, el cual al tomar valores menores a 2 en ambas comunidades (Dmg= 0.8234 MHF vs 0.5925 CUS), indicando una baja riqueza de especies.

El Índice de Simpson, al ser indicador de dominancia, al ser cercano a 0, indica baja dominancia, o alta uniformidad en cuanto a la representatividad de las especies, la cual es parecida en la microcuenca delimitada y el predio.

El índice de Shannon-Wiener contempla tanto la riqueza de especies, como el número de individuos de cada especie (su abundancia) y en el caso del estrato herbáceo, ambas comunidades pueden ser consideradas poco diversas, al poseer valores menores a 3 (H'= 1.8653 MHF vs 1.5340 CUS).

Por otro lado, el valor de J' indica que las especies de la microcuenca delimitada y del área solicitada para cambio de uso de suelo se encuentran medianamente representados, en cuanto a número de individuos que las representan.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el análisis de abundancia relativa de las especies, el cual aunado a la composición de especies nos permitirá determinar si éstas corresponden a vegetación primaria y/o de importancia ecológica que las haga susceptibles de rescate y reubicación y con ello, no comprometer su permanencia dentro del ecosistema.

Abundancia relativa

Nombre común	Especie	Microcuenca	CUSTF
--------------	---------	-------------	-------





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Foja estreña	<i>Roldana oaxacana</i>	11.94	6.67
Hoja de sierra	<i>Prunus serotina</i>	-	3.33
Enredadera hoja lanza	<i>Desmodium uncinatum</i>	37.31	46.67
Pegajosa flor blanca	<i>Ageratina petiolaris</i>	-	13.33
Hoja nanche	<i>Garrya laurifolia</i>	-	6.67
Pasto bambucillo	<i>Lasiacis ruscifolia</i>	-	20.00
Hoja chinita	<i>Monnina xalapensis</i>	4.48	3.33
Timbre	<i>Acacia angustissima</i>	2.99	-
Hoja rasposa	<i>Tournefortia hirsutissima</i>	2.99	-
Falsa serpentina	<i>Chimaphila maculata</i>	14.93	-
Enredadera pata de pato	<i>Passiflora foetida</i>	2.99	-
Cresta de gallo	<i>Castilleja arvensis</i>	2.99	-
Jarritos rojos	<i>Lobelia laxiflora</i>	2.99	-
Morita azul	<i>Cornus excelsa</i>	16.42	-

La especie con mayor abundancia relativa en la microcuenca delimitada es *Desmodium uncinatum* (AR= 37.31 %), seguida de *Cornus excelsa* (AR= 16.42 %), *Chimaphila maculata* (AR= 14.93 %) y *Roldana oaxacana*, con AR= 11.94 %; el resto de las especies tiene porcentajes menores a 5.

En relación al área solicitada para cambio de uso de suelo, *Desmodium uncinatum* con AR= 46.67, es la especie con mayor porcentaje de abundancia, seguida de *Lasiacis ruscifolia* y *Ageratina petiolaris*, con AR= 20 % y 13.33 %, respectivamente.

Como se observa, en la microcuenca delimitada tanto la riqueza como índices de diversidad resultaron mayores en comparación con los valores del predio, lo cual demuestra que la eliminación de vegetación por el cambio de uso de suelo solicitado, no pone en riesgo la diversidad de la vegetación propia del estrato herbáceo del Bosque de Pino-Encino.

Suculentas, agaves y epifitas

Composición

Como se muestra en la tabla siguiente, el estrato de suculentas, agaves y epifitas de la microcuenca presentó una riqueza de 8 especies, de las cuales siete se registraron únicamente en ella: *Tillandsia schiedeana*, *Dichaea glauca*, *Polypodium martensii*, *Pleopeltis mexicana*, *Peperomia leptophylla*, *Epidendrum radioferens*, *Tillandsia utriculata* y *Oncidium cheiroporum*. Ninguna de estas especies será afectada por la ejecución del cambio de uso de suelo solicitado.

En relación al área del proyecto, se registraron 3 especies en el estrato, dos de ellas de aparición o registro exclusivo: *Agave potatorum* y *Tillandsia fasciculata*.

Finalmente, una especie se registró tanto en la microcuenca como en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo: *Tillandsia utriculata*.

Análisis de similitud

El análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard muestra que el estrato de suculentas, agaves y epifitas del Bosque de Pino-Encino de la microcuenca y predio son similares 10%, en cuanto a composición de especies.





Índices de diversidad

Índice	Microcuencia	CUSTF
Riqueza específica (S)=	8	3
Índice de Margalef (Dmg)=	0.9163	0.3909
Índice de Simpson (D)=	0.4007	0.5822
Diversidad de Simpson (1-D)=	0.5993	0.4178
Índice de Shannon-Wiener (H')=	1.1567	0.7299
Máxima diversidad (Hmax)=	2.0794	1.0986
Equidad de Pielou (J') =	0.5562	0.6644
Hmax - H' =	0.9228	0.3687

Los resultados muestran que tanto riqueza de especies como índices de diversidad son mayores en la microcuencia delimitada, en relación al área solicitada para cambio de uso de suelo.

Relacionado a la riqueza de especies, está el Índice de Margalef, el cual al tomar valores menores a 2 en ambas comunidades (Dmg= 0.9163 MHF vs 0.3909 CUS), indica una baja riqueza.

El Índice de Simpson, al ser indicador de dominancia, al ser cercano a 0, indica baja dominancia, o alta uniformidad en cuanto a la representatividad de las especies, la cual es parecida en la microcuencia delimitada y el predio.

El índice de Shannon-Wiener contempla tanto la riqueza de especies, como el número de individuos de cada especie (su abundancia) y en el caso del estrato de suculentas, agaves y epífitas, ambas comunidades pueden ser consideradas poco diversas, al poseer valores menores a 3 (H'=1.1567 MHF vs 0.7299 CUS).

Por otro lado, el valor de J' indica que las especies del área de la microcuencia se encuentran medianamente representados, en cuanto a número de individuos que las representan.

Adicionalmente, a continuación, se presenta el análisis de abundancia relativa de las especies, el cual aunado a la composición de especies nos permitirá determinar si éstas corresponden a vegetación primaria y/o de importancia ecológica que las haga susceptibles de rescate y reubicación y con ello, no comprometer su permanencia dentro del ecosistema.

Abundancia relativa.

Nombre común	Especie	Microcuencia	CUSTF
Maguey	<i>Agave potatorum</i>	-	20.00
Tillandsia gris	<i>Tillandsia fasciculata</i>	-	6.67
Tillandsia aguja	<i>Tillandsia schiedeana</i>	1.06	-
Orquidea palmita	<i>Dichaea glauca</i>	1.59	-
Helecho catalán	<i>Polypodium martensii</i>	38.10	-
Helecho una hojita	<i>Pleopeltis mexicana</i>	50.26	-
Roseta suculenta	<i>Peperomia leptophylla</i>	4.23	-
Orquidea	<i>Epidendrum radioferens</i>	1.06	-
Bromelia	<i>Tillandsia utriculata</i>	2.12	73.33
Orquidea amarilla	<i>Oncidium cheiroporum</i>	1.59	-





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

La especie con mayor abundancia relativa en la microcuenca delimitada es *Pleopeltis mexicana* (AR= 50.26 %), seguida de *Polypodium martensii* (AR= 38.10 %); el resto de las especies tiene porcentajes menores a 5.

En relación al área solicitada para cambio de uso de suelo, *Tillandsia utriculata* con AR= 73.33 %, es la especie con mayor porcentaje de abundancia, seguida de *Agave potatorum* y *Tillandsia fasciculata*, con AR= 20 % y 6.67 %, respectivamente.

Como se observa, en la microcuenca delimitada tanto la riqueza como índices de diversidad resultaron mayores en comparación con los valores del predio, lo cual demuestra que la eliminación de vegetación por el cambio de uso de suelo solicitado, no pone en riesgo la diversidad de la vegetación propia del estrato de suculentas, agaves y epífitas, del Bosque de Pino-Encino.

CONCLUSIONES GENERALES

Del análisis anterior se desprende que la MHF es más diversa que el área del proyecto. Igualmente, las de la MHF son comunidades más homogéneas en cuanto a composición de especies, lo cual indica que no hay dominancia de alguna sobre el resto. Para las especies que resultaron exclusivas del área solicitada para cambio de uso de suelo, o con importancia ecológica se favorecerá su rescate y reubicación, para asegurar su permanencia dentro del ecosistema de Bosque de Pino-Encino de la MHF.

Por lo anterior, se puede afirmar que la ejecución del cambio de uso de suelo propuesto no compromete la biodiversidad de flora.

FAUNA DE LA MICROCUENCA Y EL SITO DEL PROYECTO

Análisis de fauna

En los apartados siguientes se realizará el análisis de cada uno de los grupos identificados tanto en la microcuenca hidrológica forestal como en el polígono solicitado para cambio de uso de suelo.

Aves

Como se muestra en la tabla siguiente, el grupo de aves de la MHF presentó una riqueza de 13 especies, de las cuales cinco se encontraron únicamente en esa área; es decir, fueron de aparición o registro exclusivo de la MHF: *Buteo jamaicensis*, *Trogon mexicanus*, *Pitangus sulphuratus*, *Cathartes aura*, *Falco peregrinus*. Ninguna de éstas se afectará por el desarrollo del proyecto.

En cuanto a la zona del proyecto, se registraron ocho especies pertenecientes a este grupo, todas ellas presentes también en la MHF.

Nombre común	Especie	No. ind Microcuenca	No. ind CUSTF
Zopilote común	<i>Coragyps atratus</i>	4	2
Paloma doméstica	<i>Columba livia</i>	5	3
Paloma alas blancas	<i>Zenaida asiatica</i>	5	1
Chachalaca pálida	<i>Ortalis poliocephala</i>	2	1





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Aguiluila cola roja	Buteo jamaicensis	1	-
Coa mexicana	Trogon mexicanus	1	-
Vireo anteojo	Vireo solitarius	1	1
Bienteveo común	Pitangus sulphuratus	2	-
Zopilote aura	Cathartes aura	3	-
Tortolita cola larga	Columbina inca	2	2
Cuervo común	Corvus corax	4	2
Quebrantahuesos	Caracara cheriway	4	2
Halcón peregrino	Falco peregrinus	2	-

Análisis de similitud

El análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard muestra que el grupo de aves de la microcuenca y predio son similares en más del 38% de composición de especies, la cual es considerada como baja.

Mamíferos

Como se muestra en la tabla siguiente, el grupo de mamíferos de la microcuenca presentó seis especies, cuatro de ellas de registro exclusivo en esta zona: *Marmosa canescens*, *Didelphis marsupialis*, *Bassariscus sumichrasti*, *Oligoryzomys fulvescens*.

En la zona del proyecto se encontraron dos especies: *Sciurus aureogaster*, *Procyon lotor*, las cuales se registraron también en la microcuenca. Entonces, ninguna especie se presentó únicamente en el área de cambio de uso de suelo.

Nombre común	Especie	No. ind. microcuenca	No. ind. CUSTF
Tlacuache raton gris	<i>Marmosa canescens</i>	3	-
Ardilla vientre rojo	<i>Sciurus aureogaster</i>	3	1
Tlacuache sureño	<i>Didelphis marsupialis</i>	1	-
Cacomixtle tropical	<i>Bassariscus sumichrasti</i>	1	-
Mapache	<i>Procyon lotor</i>	1	1
Rata arrocera pigmea	<i>Oligoryzomys fulvescens</i>	4	-

Análisis de similitud

El análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard muestra que el grupo de mamíferos de microcuenca y predio son similares en 25% de composición de especies, la cual es considerada como baja.

Herpetofauna

Como se muestra en la tabla siguiente, la herpetofauna de la MHF presentó una riqueza de ocho especies, de las cuales cinco se encontraron únicamente en esa área; es decir, fueron de aparición o registro exclusivo de la MHF: *Phrynosoma braconnieri*, *Mesaspis juarezi*, *Pitouphis lineaticollis*, *Thamnophis godmani*, *Thorius insperatus*; éstas no se afectarán por el desarrollo del proyecto.

En cuanto a la zona del proyecto, se registraron tres especies pertenecientes a este grupo, todas ellas presentes también en la MHF: *Sceloporus formosus*, *Sceloporus grammicus*, *Anolis*





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

quercorum.

Nombre común	Especie	No. ind microcuenca	No. ind CUSTF
Lagartija espinosa	<i>Sceloporus tormosus</i>	5	2
Lagartija espinosa del mezquite	<i>Sceloporus grammicus</i>	3	1
Camaleón de cola corta	<i>Phrynosoma braconnieri</i>	1	-
Lagarto escorpión	<i>Mesaspis juarezi</i>	3	-
Abaniquillo de encino	<i>Anolis quercorum</i>	2	1
Cinquate sureño	<i>Pitouphis lineaticollis</i>	1	-
Culebra listonada	<i>Thamnophis godmani</i>	1	-
Tlaconete	<i>Thorius insperatus</i>	2	-

Análisis de similitud

El análisis del Coeficiente de Similitud de Jaccard indica que la herpetofauna de la microcuenca y predio son similares en 27% de composición de especies, la cual es considerada como baja.

Índices de diversidad

La siguiente tabla muestra el resumen de los índices de diversidad obtenidos para cada uno de los grupos faunísticos identificados tanto en el área de la microcuenca delimitada, como en la zona a desarrollar el proyecto.

Índice	Aves MH	Mamíferos MH	Herpetofauna MH	Aves CUS	Mamíferos CUS	Herpetofauna CUS
Riqueza específica (S)=	14	6	8	8	2	3
Índice de Margalef (Dmg)=	3.5485	1.9494	2.4218	3.0314	1.4427	1.4427
Índice de Simpson (D)=	0.0888	0.2189	0.1667	0.1224	0.5000	0.3750
Diversidad de Simpson (1-D)=	0.9112	0.7811	0.8333	0.8776	0.5000	0.6250
Índice de Shannon-Wiener (H')=	2.5131	1.6313	1.9231	2.1440	0.6931	1.0397
Máxima diversidad (Hmax)=	2.6391	1.7918	2.0794	2.1972	0.6931	1.0986
Equidad de Pielou (J') =	0.9523	0.9105	0.9248	0.9758	1.0000	0.9464
Hmax- H' =	0.1259	0.1604	0.1564	0.0533	0.0000	0.0589

Conclusiones generales

Si bien el cambio de uso de suelo ocasionará alteraciones en el ecosistema de bosque de pino / encino, el efecto que éste tendrá sobre la fauna será mínimo, pues la superficie solicitada para desmontar es menor a media hectárea. Aunado a ello, los indicadores de diversidad estimados, así como los comparativos de especies e índice de similitud, muestran que todos los grupos identificados tienen mayor riqueza y diversidad en la microcuenca hidrográfica delimitada como área de influencia del proyecto. Adicionalmente, todas las especies que se encontraron en el área solicitada para cambio de uso de suelo, se registraron también en la microcuenca. Por último, se propone un programa de ahuyentamiento y en su caso, rescate y reubicación de especies, el cual asegura que no se comprometerá la diversidad.

En cuanto al comportamiento de las especies faunísticas, del análisis efectuado se observa que en el área solicitada para cambio de uso de suelo se registraron mayormente especies que habitan preferentemente espacios abiertos, perturbados o cercanos a asentamientos humanos, que pueden ser consideradas como especies indicadoras de perturbación antrópica.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Entonces, del análisis efectuado se concluye que el cambio de uso de suelo propuesto no compromete la biodiversidad de fauna del ecosistema de bosque de pino - encino.

Adicionalmente, se mencionan las siguientes medidas de prevención y mitigación para la ejecución del cambio de uso de suelo:

- Ejecución del programa de rescate y reubicación de especies de importancia ecológica.
- Se respetará el número de individuos y volumen por especie, calculados y señalados en el capítulo VII del Estudio Técnico.
- Para evitar la afectación a la vegetación aledaña a la zona del proyecto, el derribo de los árboles deberá hacerse de forma direccional, dirigiendo la caída hacia el interior del sitio del proyecto.
- El derribo y corte de la vegetación, deberá hacerse de forma organizada y de preferencia por medio de la utilización de herramienta como motosierras, hachas y machetes.
- Se prohíbe la remoción de vegetación para apertura de nuevos accesos al sitio del proyecto, en el entendido que actualmente se cuenta con una brecha transitable en cualquier época del año al sitio del proyecto.
- Queda estrictamente prohibido el aprovechamiento de cualquier especie vegetal, fuera del área del proyecto.
- Se establecerán letreros prohibitivos para el uso incorrecto de la vegetación hacia el interior del sitio del proyecto.
- La aplicación del programa de rescate dirigido a la fauna silvestre, se deberá aplicar dos semanas antes de iniciar con el cambio de uso de suelo, a fin de llevar a cabo el rescate, ahuyentamiento y reubicación de especies de mamíferos, aves y reptiles, para asegurar su permanencia en sitios alternos.
- Es necesario llevar a cabo actividades de seguimiento, para garantizar que la fauna silvestre sobre todo pequeños mamíferos no retornen al sitio del proyecto, en caso de ser así, es necesaria su captura y nueva reubicación.
- Antes de iniciar con las actividades del cambio de uso de suelo, las responsables del proyecto, deberán contratar personal especializado para la impartición de pláticas o talleres, dirigidos hacia operadores y trabajadores para que, por medio de estas, se induzca la cultura del cuidado y protección de la fauna silvestre.

Con base en los razonamientos arriba expresados y en los expuestos por el promovente, esta autoridad administrativa considera que se encuentra acreditada la primera de las hipótesis normativas establecidas por el artículo 93 párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto que con éstos ha quedado técnicamente demostrado que el desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en cuestión, mantiene la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados

2.- Por lo que corresponde al **segundo de los supuestos**, referente a la obligación de demostrar que **la erosión de los suelos se mitigue**, se observó lo siguiente:





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Del estudio técnico justificativo, se desprende información contenida en diversos apartados del mismo, consistente en que:

De acuerdo al conjunto de datos vectoriales Edafología, escala 1: 1,000,000 del INEGI, la superficie que ocupa el proyecto, presenta los siguientes tipos de suelo:

Luvisol vértico+Litosol+Regosol eútrico/clase textural fina/fase física lítica

Suelos luvisoles. El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda.

Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales.

Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo.

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso son integrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones ambientales, otorgan una gran diversidad a este Grupo.

Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de saturación.

Luvisol vértico. El suelo presenta un horizonte vértico. Es un horizonte subsuperficial arcilloso que, como resultado de expansión y contracción, presenta superficies pulidas (slickensides) y agregados estructurales en forma de cuña. Cuando está seco muestra anchas y profundas grietas.

Los horizontes vérticos son arcillosos, con una consistencia dura a muy dura. Cuando secos, los horizontes vérticos muestran grietas de 1 cm o más de ancho. Es muy obvia la presencia de caras de agregados pulidas, brillantes (slickensides), generalmente en ángulos agudos.

Características adicionales

El COLE es una medida del potencial de expansión-contracción y se define como la relación de la diferencia entre la longitud húmeda y la longitud seca de un terrón con su longitud seca: $(L_h - L_s)/L_s$, donde L_h es la longitud a 33 kPa de tensión y L_s la longitud en seco. En los horizontes vérticos el COLE es más de 0.06.

Relaciones con algunos otros horizontes de diagnóstico. Varios otros horizontes de diagnóstico también pueden tener elevados contenidos de arcilla, por ejemplo el horizonte árgico, nátrico y nítrico. Estos horizontes carecen de la característica típica del horizonte vértico; sin embargo, pueden estar ligados lateralmente en el paisaje, con el horizonte vértico generalmente ocupando la posición más baja.

Erosión hídrica





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

La metodología empleada para estimar el riesgo de erosión laminar, corresponde a la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo y su forma revisada (RUSLE por sus siglas en inglés) (Renard et al., 1996). La gran ventaja de su utilización reside en el rigor con que los cinco factores asociados con la erosión y que componen la ecuación, reproducen las condiciones del medio al interpretar los mecanismos erosivos por sus causas y efectos (Almorox et al., 1994).

La ecuación, se representa mediante las siguientes variables:

$$A = R * K * LS * C * P$$

Donde:

A = Pérdida de suelo promedio anual

R = Factor erosividad de las lluvias

K = Factor erodabilidad del suelo

LS=Factor topográfico

C = Factor de cobertura vegetal, adimensional

P = Factor de protección por obras de conservación de suelo

Se consideraron tres escenarios:

- 1) erosión potencial -con suelo desnudo-
- 2) en las condiciones actuales del predio;
- 3) erosión en el polígono de rescate, previo a la reubicación de especies;
- 4) erosión en el polígono de rescate, posterior a la reubicación de especies.

A continuación, se muestran los resultados de la erosión hídrica en la zona del proyecto, considerando cuatro distintos escenarios.

Escenario	Superficie (ha)	R	K	LS	C	P	ton/ha/año	ton/año
1	0.4918799	143.78	0.026	24.1082	0.45	-	40.5552	19.9483
2	0.4918799	143.78	0.026	24.1082	0.004	-	0.3605	0.1773
3	0.7634	143.78	0.026	16.4865	0.45	-	27.7339	21.1720
4	0.7634	143.78	0.026	16.4865	0.003	0.800	0.1479	0.1129

De esta forma tenemos que para la erosión hídrica actual en el área del proyecto se presenta una pérdida de suelo de 0.3605 ton/ha/año, siendo una pérdida de 0.1773 ton/año en toda la superficie. Al ejecutarse el cambio de uso de suelo se tendrá una pérdida de suelo de 40.5552 ton/ha/año y 19.9483 ton/año en toda el área.

Por otro lado, en las 0.7634 hectáreas que conforman el polígono en que se reubicarán las especies provenientes del rescate, se presenta una pérdida actual de suelo estimada en 21.1720





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

toneladas anuales. Una vez efectuada la reubicación, este valor disminuye a 0.1129 toneladas anuales, lo cual implica una disminución de 21.0591 toneladas de suelo erosionado por acción del agua.

Erosión eólica

Para la estimación de la erosión eólica, se empleó la metodología propuesta por la SEDESOL et al, 2000, para el Manual de Ordenamiento Ecológico de la SEDUE. La fórmula empleada para el cálculo de la erosión eólica es la siguiente:

$$\text{Erosión eólica} = \text{IAVIE} * \text{CATEX} * \text{CAUSO}$$

Donde:

PECRE: Periodo de crecimiento (días con lluvia)

IALLU: Índice de agresividad de la lluvia

IAVIE: Índice de agresividad del viento

CAERO: Calificación de la erodabilidad

CATEX: Calificación de la textura y fase

CATOP: Calificación de la topografía

CAUSO: Calificación por uso de suelo

Así, en la siguiente tabla se presenta el resumen de la estimación de la pérdida de suelo por acción del viento en los cuatro escenarios considerados:

- 1) erosión potencial -con suelo desnudo-
- 2) en las condiciones actuales del predio;
- 3) erosión en el polígono de rescate, previo a la reubicación de especies;
- 4) erosión en el polígono de rescate, posterior a la reubicación de especies

Variable	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Escenario 4
IAVIE	29.91	29.91	29.91	29.91
CATEX	0.1	0.1	0.1	0.1
CAUSO	0.1	0.4	0.4	0.15
ton/ha/año	0.299	1.196	1.196	0.449
ton/año	0.147	0.588	0.913	0.342

Así, considerando el polígono cubierto con vegetación, la erosión eólica alcanza valores de 0.147 ton/año. Al eliminarse la cobertura vegetal y considerando el suelo desnudo, se tienen valores de 0.588 ton/año.





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

Por otro lado, considerando el polígono para realizar la reubicación de las especies provenientes del rescate, en condiciones actuales se estima una pérdida de 0.913 toneladas anuales; una vez efectuada la reubicación este valor disminuye hasta las 0.342 toneladas de pérdida de suelo por acción del viento, lo cual implica una disminución de la erosión de 0.571 toneladas.

Análisis de la pérdida de suelo

A continuación, se muestran los valores de erosión total (hídrica más eólica) bajo dos escenarios considerados:

1. Con cambio de uso de suelo (sin cobertura vegetal ni prácticas de conservación) POTENCIAL
2. Condiciones actuales (sin prácticas de conservación de suelos)
3. Polígono de rescate, previo a la reubicación
4. Polígono de rescate, con reubicación de especies

Escenario	E. hídrica (ton/año)	E. eólica (ton/año)	E. total (ton/año)
1	19.9483	0.588	20.5363
2	0.1773	0.147	0.3243
3	21.172	0.913	22.085
4	0.1129	0.449	0.5619

De la tabla anterior se advierte que bajo las condiciones actuales de cobertura vegetal se pierden anualmente 0.3243 toneladas de suelo, considerando tanto la erosión hídrica como eólica. Una vez ejecutado el cambio de uso de suelo se perderían 20.5363 toneladas anuales, lo cual supone un incremento de 20.212 toneladas (Escenario 1 / Escenario 2).

Por otro lado, la reubicación de especies en el polígono seleccionado disminuirá la erosión en 21.5231 toneladas (Escenario 3 / Escenario 4).

Sin embargo, y dado que el establecimiento y cobertura de vegetación no se da de manera inmediata, se considera de manera adicional el establecimiento de tinas ciegas (también llamadas zanjas trinchera) en el sitio de reubicación de especies de flora procedentes del rescate de individuos seleccionados (Capítulo XII del ETJ), más las medidas de mitigación descritas en el capítulo VIII.

Así, se estima la implementación de 190 zanjas trinchera, las cuales tienen capacidad de captación de más de 97 toneladas, con lo cual queda compensada la cantidad de suelo que se erosionaría por la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, se establecen las siguientes medidas de prevención y mitigación para la pérdida de suelo:

- Queda estrictamente prohibido, la compostura de vehículos automotores hacia el interior del área del proyecto.
- La carga de combustible a la maquinaria pesada, se hará de forma tal que se deberá evitar el escurrimiento de combustible ya sea diésel o gasolina al suelo-





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

- Se prohíbe la carga de combustible a vehículos tipo pick-up, en el área del proyecto, estos deberán abastecerse de combustible en las gasolineras ubicadas en las cercanías del proyecto.
- En caso de escurrimiento de materiales peligrosos, como son gasolina, diésel y/o aceites, los responsables del proyecto, deberán hacer el retiro inmediato de suelo contaminado, almacenarlo en recipientes herméticos y transportar el material contaminado a los centros de disposición final registrados ante las instancias federales en la materia.
- Queda estrictamente prohibido, el almacenamiento de sustancias clasificadas como peligrosas hacia el interior del área del proyecto.

Por lo anterior, con base en los razonamientos arriba expresados, esta autoridad administrativa considera que se encuentra acreditada la segunda de las hipótesis normativas establecidas por el artículo 93, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a que, con éstos ha quedado técnicamente demostrado que con el desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en cuestión, **la erosión de los suelos se mitiga**.

3.- Por lo que corresponde al **tercero de los supuestos** arriba referidos, relativo a la obligación de demostrar que **la capacidad de almacenamiento de carbono se mitigue**, se observó lo siguiente:

Del estudio técnico justificativo se desprende lo siguiente:

Los bosques, selvas y demás tipos de vegetación capturan, almacenan y liberan carbono como resultado de los procesos fotosintéticos, de respiración y de degradación de materia seca. El saldo es una captura neta positiva cuyo monto depende del manejo que se le dé a la cobertura vegetal, así como de la edad, distribución de tamaños, estructura y composición de ésta. Este servicio ambiental que proveen los tipos de vegetación como secuestradores de carbono (sumideros), permite equilibrar la concentración de este elemento, misma que se ve incrementada debido a las emisiones producto de la actividad humana (Torres-Rojo y Guevara-Sanginés, 2002).

El concepto de captura de carbono normalmente integra la idea de conservar los inventarios de este elemento que se encuentran en suelos, bosques y otros tipos de vegetación y donde es inminente su desaparición, así como el incremento de los sumideros de carbono (aditividad) a través del establecimiento de plantaciones, sistemas agroforestales, y la rehabilitación de bosques degradados (Tipper, 2000).

Según Masera et al, 2001; Ordóñez, 2004 citado por Vega-López, 2009, hace mención que, en su calidad de sumideros de carbono, los ecosistemas terrestres y específicamente los bosques mesófilos, tropicales y templados, son altamente eficientes. Se ha comprobado que, para el caso de los ecosistemas terrestres mexicanos, la mayor proporción de carbono almacenado se encuentra respectivamente en la vegetación aérea, los suelos y las raíces o vegetación del subsuelo.

Esta información es crucial para identificar la importancia de las diversas coberturas forestales en relación con el almacenamiento y captura de carbono. Igualmente resulta importante para estimar el valor económico potencial de tales ecosistemas terrestres como sumideros (Vega-López, 2009).

Para estimar de la cantidad de carbono que se perdería por el cambio de uso de suelo





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

propuesto, se siguió la metodología propuesta por el IPCC, la cual parte del volumen de remoción (estimado en el capítulo VII del Estudio Técnico), y emplea la siguiente metodología:

$Biomasa = Vol * Fd$

Donde:

Vol= volumen estimado

Fd= factor de densidad de la madera (0.5)

Posteriormente, la cantidad de carbono almacenado se estima con la siguiente ecuación:

$C = Biomasa * FCC * FEB$

FCC= factor de captura de carbono (0.5)

FEB= fator de expansión de la biomasa (1.3)

Así, se tiene lo siguiente:

Vegetación	Volumen (m3)	Fd	FCC	FEB	Carbono (ton)
Bosque de pino-encino	172.6047	0.5	0.5	1.3	56.097

Así, el carbono que se perdería por la ejecución del cambio de uso de suelo, considerando el estrato arbóreo, se estima en 56.097 toneladas.

Ahora bien, diversos estudios señalan que, dado que los bosques crecen más rápido en etapas juveniles, éstos son capaces de capturar más dióxido de carbono que en etapas maduras.

Masera y Ordoñez, 1997, establecieron también la captura unitaria por opción reforestación en bosques mexicanos, cuyas estimaciones para el tipo de ecosistema que nos ocupa, corresponden a 72.5 tonC/ha.

Así, y dado que se contempla la reforestación en 0.7634 ha, con especies principalmente del estrato herbáceo provenientes del rescate propuesto, la capacidad de captura de carbono se estima como:

Superficie de reforestación x secuestro neto de C

$0.7634 \times 72.5 = 55.34 \text{ tC}$

Resultando en una capacidad de captación de carbono = 55.34 toneladas de carbono, cantidad proporcional a la que se estima eliminar al ejecutar el cambio de uso de suelo solicitado.

Por lo anterior, con base en los razonamientos arriba expresados, esta autoridad administrativa considera que se encuentra acreditada la segunda de las hipótesis normativas establecidas por el artículo 93, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto a que, con éstos ha quedado técnicamente demostrado que con el desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en cuestión, **la capacidad de almacenamiento se mitiga.**





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

4.- Por lo que corresponde al **cuarto de los supuestos** arriba referidos, relativo a la obligación de demostrar que **el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen**, se observó lo siguiente:

Del estudio técnico justificativo se desprende lo siguiente:

Dentro del polígono propuesto a cambio de uso de suelo no se encontraron corrientes naturales perennes ni permanentes.

Para estimar un coeficiente de escurrimiento se parte del estudio de un evento de lluvia (una tormenta) que sea lo suficientemente intensa para vencer la capacidad de infiltración del suelo. La infiltración depende de diversos factores, entre los que se encuentran (Aparicio, 2006):

- a. La textura del suelo
- b. Contenido de humedad inicial
- c. Contenido de humedad de saturación
- d. Cobertura vegetal
- e. Uso del suelo
- f. Aire atrapado
- g. Lavado de material fino
- h. Compactación
- i. Temperatura, sus cambios y diferencias.

El escurrimiento se puede estimar a través de la aplicación del método propuesto en la NOM / 011 / CNA / 2000 que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de aguas nacionales.

Se realizó el cálculo del volumen de infiltración en el predio bajo tres escenarios, mismos que presentan la siguiente secuencia en base al desarrollo del proyecto en cuestión:

1. Área de cambio de uso del suelo sin proyecto: Este escenario hace referencia a las actuales del predio, sin el establecimiento de ningún tipo de estructuras, sin el desarrollo de actividades relacionadas con la remoción de la vegetación.
2. Área de cambio de uso del suelo con proyecto: Este escenario es el que se espera después de haber terminado con las etapas de preparación del sitio y desmonte, que por lo general es mayor al que se produce en las condiciones actuales del área de estudio.
3. Área de rescate, antes de la reubicación. Este escenario considera el polígono seleccionado para realizar la reubicación de especies provenientes del rescate del área del proyecto, con escasa cobertura vegetal.
4. Área de rescate, considerando la reubicación de especies.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Así, se tienen los siguientes resultados en los diferentes escenarios considerados:

1) Antes del cambio de uso de suelo

Infiltración=4,931.2 - 638.29 =4,292.81 m³

2) Después del cambio de uso de suelo

Infiltración=4,913.2 -998.28=3,932.816 m³

La afectación en la infiltración por la ejecución del proyecto se reflejará en una reducción de 359.99m³ anuales.

Esta cantidad se recuperará con el establecimiento de obras de retención y captación hídrica asociadas al establecimiento de una plantación con especies que resulten de la ejecución del programa de rescate y reubicación, más el establecimiento de zanjas trinchera.

A continuación, se presenta el análisis de la cantidad de agua recuperada considerando el establecimiento de la plantación asociada a las especies provenientes del rescate y reubicación en una superficie de igual a la solicitada para cambio de uso de suelo.

3) Antes de la reubicación

Infiltración=7,653.09 - 1,549.34 = 6,103.75 m³

4) Después de la reubicación

Infiltración= 7,653.09 - 990.63 = 6,662.46 m³

Es así, que la reubicación de especies en el polígono propuesto ayuda a incrementar la capacidad de infiltración en 558.71 m³ anuales, lo cual, aunado a las obras de conservación de suelos descritas en el estudio técnico, aseguran compensar la cantidad de agua que dejaría de infiltrarse por el desarrollo del proyecto solicitado.

De manera adicional, se contempla el establecimiento de obras de conservación de suelos, consistentes en 190 zanjas trinchera.

El promovente señala medidas para compensar la disminución de la infiltración en la zona del proyecto, así como evitar la disminución en la calidad del agua, consistente en:

- Construcción de obras de conservación de suelos, consistente en 190 zanjas trinchera.
- Se deberá hacer un manejo adecuado de los residuos de manejo especial y sanitarios que se generen durante esta actividad.
- Se prohibirán los cambios de aceite en las áreas de proyecto y orilla de los caminos sobre todo en vehículos tipo pick-up, de carga y maquinaria pesada.

Por lo anterior, con base en las consideraciones arriba expresadas, esta autoridad administrativa estima que se encuentra acreditada la cuarta de las hipótesis normativas que establece el





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

artículo 93, párrafo primero, de la LGDFS, en cuanto que con éstos ha quedado técnicamente demostrado que con el desarrollo del proyecto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en cuestión, **el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiga.**

- i. Que en cumplimiento de la obligación que a esta autoridad administrativa le impone lo dispuesto por el artículo 93, párrafos segundo, cuarto y quinto de la LGDFS, esta autoridad administrativa se abocó al estudio de la información y documentación que obra en el expediente, observándose lo siguiente:

El artículo 93, párrafos, segundo, cuarto y quinto, establecen:

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la Secretaría deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las opiniones técnicas emitidas por los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate.

...

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la flora y fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat conforme lo establezca en el Reglamento. Dichas autorizaciones deberán sujetarse a lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamientos ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Tratándose de terrenos ubicados en territorios indígenas, la autorización de cambio de uso de suelo además deberá acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, en los términos de la legislación aplicable.

1.- En lo que corresponde a la opinión del Consejo Estatal Forestal recibida mediante escrito de fecha 28 de abril de 2023, el Consejo Estatal Forestal del estado de Oaxaca manifiesta que No existe inconveniente por parte de los integrantes de la Comisión a efecto de que la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado emita la autorización solicitada.

2.- En lo que corresponde a los programas de rescate y reubicación de las especies de la flora y la fauna, los programas de ordenamiento ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones, se manifestó y comprometió a lo siguiente:

Programa de rescate y reubicación de especies de la flora.

Al respecto, y para dar cumplimiento a lo que establece el párrafo antes citado, el promovente manifiesta que se llevará a cabo un programa de rescate y reubicación de flora silvestre, con base a los datos específicos en el artículo 141 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dicho programa se anexa al presente Resolutivo.

Programa de rescate y reubicación de especies de la fauna.

Al respecto y como lo establece el artículo 93 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el promovente incluye en su Estudio un Programa de rescate y reubicación de fauna, el cual se anexa a la presente resolución.

Demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

Adicionalmente, el promovente realiza una adecuada vinculación con las Normas, Planes y Programas que son aplicables al proyecto.

- II. Que en cumplimiento de la obligación que a esta autoridad le impone lo dispuesto por el artículo 97 de la LGDFS, esta autoridad administrativa se abocó al estudio de la información y documentación que obra en el expediente, observándose lo siguiente:

El artículo 97 establece:

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Respecto a la prohibición de otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado, desmontado o talado sin que hayan pasado 20 años, se advierte que la misma no es aplicable al presente caso, en virtud de que no se observó que el predio en cuestión hubiere sido incendiado, desmontado o talado, tal y como se desprende del informe de la visita técnica realizada en el sitio del proyecto, en la que se constató que **no se observaron vestigios de incendios forestales, desmonte o tala.**

- III. Que con el objeto de verificar el cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 98 de la LGDFS, conforme al procedimiento señalado por los artículos 144 y 152 del RLGDFS, ésta autoridad administrativa se abocó al cálculo del monto de compensación ambiental para ser destinados a las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, determinándose lo siguiente:

Mediante oficio N° SEMARNAT-AR-0725-2023 de fecha 30 de mayo de 2023, se notificó al interesado que como parte del procedimiento para expedir la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, debería depositar al Fondo Forestal Mexicano (FFM) la cantidad de **\$106,735.76 (ciento seis mil setecientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.)**, por concepto de compensación ambiental para ser destinados a las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 1.82 hectáreas con vegetación de Bosque de pino-encino, preferentemente en el estado de Oaxaca.

- IV. Que en cumplimiento del requerimiento de esta autoridad administrativa y dentro del plazo establecido por el artículo 144, párrafo primero, del RLGDFS, mediante ESCRITO SIN NUMERO de fecha 27 de junio de 2023, recibido en esta Oficina de Representación el 27 de junio de 2023, PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, presentó copia del comprobante del depósito realizado al Fondo Forestal Mexicano (FFM) por la cantidad de **\$ 106,735.76 (ciento seis mil setecientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.)**, por concepto de compensación ambiental para ser destinados a las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 1.82 hectáreas con vegetación de Bosque de pino-encino, para aplicar preferentemente en el estado de Oaxaca.

Por los razonamientos arriba expuestos, de conformidad con las disposiciones legales invocadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracciones III, XXXIX y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12 fracciones XXIX, 16 fracciones XX, 58 fracción I y 93, 94, 95, 96, 97, 99 y 100 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 16 fracciones VII y IX, 59 párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción VII, Inciso a), 34 y 35 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

Ambiente y Recursos Naturales, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO. - AUTORIZAR por excepción el cambio de uso del suelo en terrenos forestales en una superficie de 0.49188 hectáreas para el desarrollo del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca, promovido por PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, bajo los siguientes:

TERMINOS

- i. El tipo de vegetación forestal por afectar corresponde a Bosque de pino-encino y el cambio de uso de suelo que se autoriza, se desarrollará en la superficie que se encuentra delimitada por las coordenadas UTM siguientes:

Polígono: RHIA GUATZINA

Vértice	Coordenada X	Coordenada Y
1	771613	1916794
2	771630	1916815
3	771634	1916861
4	771645	1916874
5	771619	1916923
6	771679	1916916
7	771670	1916810

- ii. Los volúmenes de las materias primas forestales a remover por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y el Código de Identificación para acreditar la legal procedencia de dichas materias primas forestales son los siguientes:

PREDIO AFECTADO: RHIA GUATZINA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: C-20-247-RHI-001/23

Especie	N° de individuos	Volúmen	Unidad de medida
<i>Pinus pseudostrobus</i>	213	163.2731	Metros cúbicos
<i>Quercus laurina</i>	98	4.4827	Metros cúbicos
<i>Quercus crassifolia</i>	16	.1568	Metros cúbicos
<i>Quercus obtusata</i>	104	4.0238	Metros cúbicos





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

<i>Baccharis heterophylla</i>	5	.033	Metros cúbicos
<i>Baccharis conferta</i>	55	.1981	Metros cúbicos
<i>Diphysa carthagenensis</i>	27	.1488	Metros cúbicos
<i>Verbesina sp.</i>	5	.028	Metros cúbicos
<i>Cornus excelsa</i>	33	.0862	Metros cúbicos
<i>Alnus acuminata (arguta)</i>	5	.1742	Metros cúbicos

- III. La vegetación forestal presente fuera de la superficie en la que se autoriza el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, no podrá ser afectada por los trabajos y obras relacionadas con el cambio de uso de suelo, aún y cuando ésta se encuentre dentro de los predios donde se autoriza la superficie a remover en el presente Resolutivo, en caso de ser necesaria su afectación, se deberá contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la superficie correspondiente.

- IV. Previo al inicio de las actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales el promovente deberá de implementar las actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre y, en su caso, el rescate y reubicación de los individuos presentes. Los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XV de este Resolutivo.

- V. El titular de la presente resolución deberá de implementar todas las acciones necesarias para evitar la cacería, captura, comercialización y tráfico de las especies de fauna silvestre, así como la colecta, comercialización y tráfico de las especies de flora silvestre que se encuentren en el área del proyecto y en las áreas adyacentes al mismo, solo se podrá realizar la colecta de especies de flora y captura de especies de fauna silvestre con el propósito de rescate y reubicación, siendo el promovente el único responsable. Los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XV de este Resolutivo.

- VI. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 141 último párrafo de su Reglamento, se adjunta como parte integral de la presente resolución, un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal que serán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, el cual deberá realizarse previa a las labores de la remoción de la vegetación y despalme, preferentemente en áreas vecinas o cercanas donde se realizarán los trabajos de cambio de uso de suelo, así como las acciones que aseguren al menos un 80 % de supervivencia de las referidas especies, en los periodos de ejecución y de mantenimiento que en dicho programa se establece. los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XV de este resolutivo.

- VII. Previo al inicio de las actividades de remoción de la vegetación del área de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, deberá implementar el programa de rescate y reubicación de las especies de flora, propuesto en el estudio técnico justificativo, así mismo, en caso de localizarse en los predios forestales requeridos, especies con categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010, estas deberán ser rescatadas. Los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XV de este resolutivo.





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

- viii. La remoción de la vegetación deberá realizarse por medios mecánicos y manual y no se deberá de utilizar sustancias químicas y fuego para tal fin. La remoción de la vegetación deberá realizarse de forma gradual, para evitar largos periodos del suelo descubierto que propician erosión. Los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XV de este resolutivo.
- ix. El derribo del arbolado se llevará a cabo usando la técnica direccional, a efecto de que el arbolado caiga hacia el lado del área sujeta a cambio de uso de suelo y no perturbe la vegetación existente y el renuevo de las zonas aledañas. Los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los informes a los que se refiere el Término XV de este Resolutivo.
- x. El material que resulte del desmonte y que no sea aprovechado, deberá ser triturado y utilizado para cubrir y propiciar la revegetación, con el fin de facilitar el establecimiento y crecimiento de la vegetación natural, para proteger el suelo de la acción del viento y lluvias, evitando la erosión, deberán depositarse en un área próxima al área de trabajo en zonas sin vegetación forestal dentro del derecho de vía. Las acciones relativas a este Término deberán reportarse conforme a lo establecido en el Término XV de este resolutivo.
- xi. Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo y agua, se deberán instalar sanitarios portátiles para el personal que laborará en el sitio del proyecto, así mismo los residuos generados deberán de ser tratados conforme a las disposiciones locales. Los resultados del cumplimiento del presente Término se incluirán en los reportes a los que se refiere el Término XV de este Resolutivo.
- xii. Se deberá dar cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación de los impactos sobre los recursos forestales consideradas en el estudio técnico justificativo, las Normas Oficiales Mexicanas y Ordenamientos Técnico-Jurídicos aplicables, así como lo que indiquen otras instancias en el ámbito de sus respectivas competencias. Los resultados de estas acciones deberán reportarse conforme a lo establecido en el Término XV de este Resolutivo.
- xiii. En caso de que se requiera aprovechar y trasladar las materias primas forestales, el titular de la presente autorización deberá tramitar ante esta Oficina de Representación la documentación correspondiente.
- xiv. Una vez iniciadas las actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y dentro de un plazo máximo de **10 días hábiles** siguientes a que se den inicio los trabajos de remoción de la vegetación, se deberá notificar por escrito a esta Oficina de Representación, quién será el responsable técnico encargado de dirigir la ejecución del cambio de uso de suelo autorizado, el cual deberá establecer una bitácora de actividades, misma que formará parte de los informes a los que se refiere el Término XV de este resolutivo, en caso de que existan cambios sobre esta responsabilidad durante el desarrollo del proyecto, se deberá informar oportunamente a esta Unidad Administrativa.
- xv. Se deberá presentar a esta Oficina de Representación con copia a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el Estado, informes semestrales y uno de finiquito al término de las actividades que hayan implicado el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, éste deberá incluir los resultados del cumplimiento de los Términos que deben reportarse, así como de la aplicación de las medidas de prevención y mitigación





**OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023**

contempladas en el estudio técnico justificativo.

- xvi. Se deberá comunicar por escrito a la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Oaxaca con copia a esta Oficina de Representación de la SEMARNAT, la fecha de inicio y término de los trabajos relacionados con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales autorizado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que esto ocurra.
- xvii. El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal derivada de la presente autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales será de 5 Año(s), a partir de la recepción de la misma, el cual podrá ser ampliado, siempre y cuando se solicite a esta Oficina de Representación, antes de su vencimiento, y se haya dado cumplimiento a las acciones e informes correspondientes que se señalan en el presente resolutivo, así como la justificación del retraso en la ejecución de los trabajos relacionados con la remoción de la vegetación forestal de tal modo que se motive la ampliación del plazo solicitado.
- xviii. El plazo para garantizar el cumplimiento y la efectividad de los compromisos derivados de las medidas de mitigación por la afectación del suelo, el agua, la flora y la fauna será de cinco años, en donde se contempla el Programa de Rescate y Reubicación de flora del proyecto.
- xix. Se procede a inscribir dicha autorización de conformidad con el artículo 35, fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Registro Forestal Nacional.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 16 fracciones VII y IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento:

- i. La PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., será el único responsable ante la PROFEPA en el estado de Oaxaca, de cualquier ilícito en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en que incurran.
- ii. La PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., será el único responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y controlar todos aquellos impactos ambientales adversos, atribuibles a la construcción y operación del proyecto que no hayan sido considerados o previstos en el estudio técnico justificativo y en la presente autorización.
- iii. La Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, podrá realizar en cualquier momento las acciones que considere pertinentes para verificar que sólo se afecte la superficie forestal autorizada, así como llevar a cabo una evaluación al término del proyecto para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación establecidas en el estudio técnico justificativo y de los términos indicados en la presente autorización.
- iv. La PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., es el único titular de los derechos y obligaciones de la presente autorización, por lo que queda bajo su estricta responsabilidad la ejecución del proyecto y la validez de los contratos civiles, mercantiles o laborales que se hayan firmado para la legal implementación y operación del mismo, así como



OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA
OFICIO N° SEMARNAT-AR-0949-2023

su cumplimiento y las consecuencias legales que corresponda aplicar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a otras autoridades federales, estatales y municipales.

- v. En caso de transferir los derechos y obligaciones derivados de la misma, se deberá dar aviso a esta Oficina de Representación, en los términos y para los efectos que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, adjuntando al mismo el documento en el que conste el consentimiento expreso del adquirente para recibir la titularidad de la autorización y responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma, así como los documentos legales que acrediten el derecho sobre los terrenos donde se efectuará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de quien pretenda ser el nuevo titular.
- vi. Esta autorización no exenta al titular de obtener aquellas que al respecto puedan emitir esta Oficina de Representación u de otras dependencias federales, estatales o municipales en el ámbito de sus respectivas competencias.

TERCERO.- Notifíquese personalmente a PROCESADORA DE AGREGADOS PETREOS RHIA GUATZINA S.P.R. DE R.I., en su carácter de PROMOVENTE, la presente resolución del proyecto denominado **CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"**, con ubicación en el o los municipio(s) de Capulalpam de Méndez en el estado de Oaxaca, por alguno de los medios legales previstos en el artículo 35 y demás correlativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ATENTAMENTE
EL ENCARGADO DE DESPACHO

BIOL. ABRAHAM SÁNCHEZ MARTÍNEZ



Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción XVI, 32, 33, 34, 35 y 81 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia definitiva del Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Oaxaca, previa designación, firma el C. Abraham Sánchez Martínez, Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial.

"Las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

- C.c.e.p. - Ing. Ricardo Ríos Rodríguez.- Encargado de Despacho de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico.
- Ing. Óscar Bolaños Morales.- Encargado de Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el Estado.
- Ing. Óscar Mejía Gómez.- Titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal en Oaxaca de la CONAFOR.

ASM/MACM/MASR/iva






...del medio ambiente...

...de la información...

...de los recursos...

...de las actividades...

...de los servicios...

SIN TEXTO




...de la información...

...de los recursos...

...de las actividades...

...de los servicios...

...de los recursos...



OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL
ESTADO DE OAXACA

BITÁCORA: 20/DS-0143/03/23
OFICIO: SEMARNAT-AR-0949-2023

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de julio de 2023

ANEXO. PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FLORA Y FAUNA DEL PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DENOMINADO "CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO BANCO RHIA GUATZINA"

Objetivos

Objetivo general

Realizar el rescate de ejemplares de flora y fauna silvestre de importancia ecológica y los que en el tiempo que se lleve a cabo el CUSTF se identifiquen en alguna categoría de riesgo de acuerdo a los listados de la NOM-059SEMARNAT-2010, sobre todo para el caso de la fauna silvestre considerando su dinámica en desplazamientos.

Objetivos específicos

- ☒ Llevar a cabo el rescate del mayor número de individuos tanto de flora como de fauna, localizados dentro de la zona de afectación del proyecto, según las especies que en el presente programa se establecen y son producto del análisis de las especies a afectar por el desarrollo del proyecto.
- ☒ Previo recorrido, ubicar y marcar las especies susceptibles de ser rescatadas para su posterior resguardo y reubicación, con el tiempo suficiente antes de iniciar las actividades de remoción de la vegetación.
- ☒ Establecer un área temporal de resguardo de los individuos rescatados de especies florísticas, para su mantenimiento y preparación antes de reubicarlos.
- ☒ Lograr un porcentaje del 80 al 90% de sobrevivencia del total de las de los individuos rescatados, propagados y reubicados.
- ☒ Verificar que los sitios de reubicación presenten las condiciones ambientales equivalentes a las del área donde fueron rescatados y realizar las liberaciones de fauna evitando en la medida de lo posible una sobrecarga en el nuevo sitio.

1

Metas y resultados





- De acuerdo a la distribución de especies en la zona propuesta para el CUSTF, coleccionar, rescatar, rehabilitar y reubicar el mayor número de individuos vegetales posibles, con los cuales se logre restaurar una superficie igual o mayor a la afectada por la remoción de la vegetación forestal.
- Rescatar el mayor número de especies de fauna silvestre en sus diferentes grupos, para su posterior reubicación, en áreas con características biológicas similares a las actualmente presentes en la zona propuesta para CUSTF.
- Con las especies rescatadas, realizar una reforestación en una superficie similar o mayor, con la finalidad de incrementar la cobertura arbórea, aumentando así la fertilidad del suelo y la capacidad de retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes.
- Con el establecimiento de la plantación derivada de las especies rescatadas, aumentar la estabilidad de los suelos, reducir la erosión hidráulica y eólica como formas de erosión presentes sobre laderas, áreas agrícolas y en suelos no consolidados.
- Lograr el 80% de sobrevivencia en la plantación hecha con las especies rescatadas, a través de los cuidados y mantenimientos de la misma, utilizando las mejores técnicas silvícolas para plantaciones.

2

Especies de flora y fauna susceptibles de rescate y reubicación

Flora

Selección de especies para rescate y reubicación

Para la selección de las especies idóneas a ser rescatadas antes de iniciar con las actividades de desmonte por el CUSTF, se consideraron los siguientes criterios de selección:

1. Que las especies estén identificadas con alguna categoría de riesgo de acuerdo a los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010.
2. Que las especies localizadas e identificadas en el estrato arbóreo, arbustivo y suculentas, sean de única distribución en la zona propuesta para el CUSTF y no en la MH.
3. Especies del grupo suculentas y epífitas, considerando que su rescate se puede hacer a través de la técnica de banqueo en individuos pequeños y en individuos de talla grande su reproducción se puede hacer de forma asexual.
4. Considerar la fisiología de las especies seleccionadas, para la planificación de la colecta de germoplasma, en caso de que la reproducción de estas sea por el método sexual, para este caso es necesario considerar la época de ejecución del CUSTF.





Considerando los criterios anteriores, no se localizaron ni identificaron especies bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo al segundo criterio, las especies para el estrato arbóreo que solo tuvieron distribución en la zona propuesta al CUSTF y no tuvieron presencias en la MH son las siguientes:

Nombre común	Especie	Familia	Forma de vida	Categoría NOM-059	Forma de reproducción
Maguey	<i>Agave potatorum</i>	Asparagaceae	Agave	S/C	Asexual
Tillandsia gris	<i>Tillandsia fasciculata</i>	Bromeliaceae	Epífita	S/C	Sexual y asexual

Considerando el número de especies que son susceptibles e idóneas para planificar su rescate y que es un número muy bajo, considerando que se pretende la diversificación florística en el área sujeta a las actividades de plantación, se propone como complemento para aumentar el número de especies las señaladas en la siguiente tabla:

Nombre común	Especie	Familia	Forma de vida	Categoría NOM-059	Forma de reproducción
Pino patula	<i>Pinus patula</i>	Pinaceae	Arbórea	S/C	Sexual
Pseudostrobus	<i>Pinus pseudostrobus</i>	Pinaceae	Arborea	S/C	Sexual
Pino douglasiana	<i>Pinus douglasiana</i>	Pinaceae	Arbórea	S/C	Sexual
Encino hoja ancha	<i>Quercus crassifolia</i>	Fagaceae	Arbórea	S/C	Sexual

3

Entonces, resumiendo las tablas anteriores, se proponen seis especies para rescate.

Métodos de rescate de flora silvestre

Colecta de germoplasma o semilla

Las semillas en una estructura que se forma luego de la fecundación de un ovulo que madura para contener un embrión y reserva de alimento protegidos por una testa. Esta estructura que proviene de una reproducción sexual de las plantas protege una planta en forma latente de condiciones no favorables, ayuda la supervivencia y la dispersión de la especie.

La colecta de semillas de la flora permite conservar en forma de semillas la vegetación del lugar que puede ser usada:

1. Restauración de bosques y ecosistemas del lugar, ya que se germinan las semillas y propagar las plantas en viveros para luego reintroducirlas en su hábitat natural.
2. Investigación sobre genética de poblaciones de plantas que estén amenazadas, en estado crítico, raras o en peligro de extinción para ver cuán diversa es su genética.





3. Manejo de las plantas *in situ* (en el hábitat natural) porque durante el proceso de colecta de semillas se toma datos sobre las plantas usadas tales como cantidad de individuos, etapa de crecimiento de la planta (plántula, etapa madura, etapa madura reproduciéndose), localización, ecología del lugar donde se encuentra la planta entre otra información.
4. Conservación *ex situ* (fuera del hábitat natural) de la diversidad de la flora del lugar, ya sea en jardines botánicos u instituciones relacionadas a la conservación. Este tipo de conservación es usada de forma complementaria a la conservación *in situ* en plantas que su ambiente natural es reducido e impactado. Los bancos de semillas es una estrategia de conservación *ex situ* que consiste de semillas secas guardadas a bajas temperaturas y bajos niveles de humedad.

Para esta forma de rescate, se proponen en la siguiente tabla las especies destinadas para tal fin y se especifica de acuerdo a su fenología la época más idónea para la realización de su colecta.

Nombre común	Especie	Forma de reproducción	Época de colecta
Pino patula	<i>Pinus patula</i>	Sexual	Noviembre-febrero
Pseudostrobus	<i>Pinus pseudostrobus</i>	Sexual	Noviembre-febrero
Pino douglasiana	<i>Pinus douglasiana</i>	Sexual	Noviembre-febrero
Encino hoja ancha	<i>Quercus crassifolia</i>	Sexual	Mayo-junio

4

Bajo este esquema de rescate, tanto sexual como asexualmente, las actividades de rescate se pueden iniciar antes y durante el CUSTF en tres especies, sin embargo, para el resto, el responsable del proyecto de forma coordinada con el asesor forestal, deberán planificar las actividades de colecta de semilla y dirigirla a los árboles que queden en pie según el proyecto arquitectónico, esto considerando que no serán removidos árboles que no se encuentren ubicados en las áreas de construcción del proyecto o en su caso y de ser muy necesario para dar cumplimiento a las metas y objetivos del presente rescate, tramitar los permisos necesarios a quien corresponda para poder hacer las colectas en áreas aledañas al proyecto y que tengan presencia de las especies seleccionadas.

Densidad de plantación

La densidad de plantación que se propone es de 1,100 plantas/ha, en una plantación a tres bolillo, con distancias entre centros de cada cepa de 3.5 m, por lo que el responsable deberá garantizar el total de plantas necesarias para cubrir una superficie de restauración de 7,666.11 m² para un total de 843 plantas, distribuidas en las especies ya señaladas.

Considerando las actividades de replantación por la pérdida de individuos que se da en una plantación por diversos factores, el número de especies rescatadas y/o reproducidas deberá ser de hasta 1,500 plantas.

Centro de resguardo, cuidados, mantenimiento y reproducción de planta

El responsable del proyecto en coordinación con su asesor ambiental, deberá disponer de un centro de almacenamiento temporal y que a su vez sirva como área de reproducción, esto considerando las dos formas de rescate de las plantas propuestas. Es necesario mencionar que este espacio de almacenamiento temporal,

Sabinos 402, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C. P. 68050
www.gob.mx/semarnat





es necesario, ya que la colocación o reubicación, así como la plantación de las especies rescatadas, no se hará de forma inmediata una vez iniciado el CUSTF, se hará al año posterior de haber iniciado las actividades, considerando que en este tiempo las plantas se les darán los cuidados necesarios para su fortalecimiento y así se asegure un mejor prendimiento en el sitio de restauración y su sobrevivencia.

El área destinada para tal fin deberá ser establecida en un sitio cercano al área del proyecto, la cual deberá tener por lo menos los siguientes servicios y condiciones para su buen funcionamiento:

- El sitio deberá ser preferentemente llano sin pendientes.
- Contar con una fuente de abastecimiento de agua para la aplicación de riegos.
- Contar con una proporción de sombra, ya sea natural o puesta con malla de media sombra.
- Facilidad en el acceso durante cualquier época del año.
- Espacio suficiente para la colocación de camas de crecimiento donde serán colocadas las estacas y plantas reproducidas.
- En la medida de lo posible, preferentemente deberá ser un sitio protegido o cercado.

Localización de los sitios de reubicación


Los ejemplares rescatados se reubicarán en un polígono que arroja una superficie de 7,666.1161 m². Las coordenadas que delimitan el polígono propuesto para las actividades de reubicación de la flora silvestre rescatada se especifican en la siguiente tabla, estas se describen en el sistema UTM (Universal Transversal de Mercator), con un DATUM definido como WGS-84, para una zona de cuadrículas 14, banda Q.

Vértice	X	Y
1	771682	1916727
2	771684	1916751
3	771682	1916777
4	771701	1916791
5	771720	1916804
6	771734	1916818
7	771746	1916812
8	771765	1916780
9	771768	1916750
10	771768	1916727
11	771772	1916705
12	771772	1916691
13	771742	1916698
14	771720	1916712
15	771710	1916721
16	771682	1916727



En la siguiente imagen se muestra la ubicación del polígono de reubicación, este ubicado y seleccionado dentro de la superficie que ocupa la microcuenca hidrográfica, el polígono propuesto fue seleccionado bajo los siguientes criterios:

- Área actualmente desprovista de vegetación.
- Área cubierta con vegetación forestal similar a la distribuida y clasificada en el sitio del proyecto.
- Área de fácil acceso, a través de vehículos tipo pick-up.
- Área preferentemente ubicada en terrenos de uso común para el establecimiento de convenios con las autoridades correspondientes, en caso de ser necesario.



Diseño de la plantación y trazo de la plantación

Es importante considerar que la distancia entre planta y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al ser adulta, tomando en cuenta que en sus etapas juveniles la plantación debe tener por lo menos el doble de densidad que cuando es adulta.

Para la realización de las actividades de reforestación, se hará mediante un diseño de plantación a tres bolillos, considerando que el terreno tiene pendientes de hasta 10% y este método es el que más se adecua al relieve del sitio.

En este diseño, las plantas se colocan formando triángulos equiláteros (lados iguales). La distancia entre planta





y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al ser adulta. Este arreglo se deberá utilizar en terrenos con pendientes mayores a 20 %, aunque también se puede utilizar en terrenos planos. Las líneas de plantación deberán seguir las curvas de nivel. Con este tipo de diseño se logra minimizar el arrastre de suelo y a su vez aprovechar los escurrimientos.

El trazo de plantación se podrá hacer con la ayuda de un clisímetro o nivel, clinómetro, estadal.

Preparación del terreno

Existen diferentes maneras de preparar el terreno donde se pretende establecer la plantación, para mejorar las condiciones del suelo y asegurar una mayor sobrevivencia de la planta. La elección del método está en función de diversos factores: superficie a reforestar, disponibilidad de recursos (humanos, económicos, maquinaria y equipo), tipo de suelo, pendiente del terreno y acceso al mismo.

Por lo general los trabajos de preparación se realizan con la ayuda de herramientas básicas como azadón, pala, talacho, barreta, pico, coa, hacha o machete, entre otras. Con este método sólo se trabaja el área donde se colocará la planta, evitando alteraciones innecesarias y la pérdida de suelo por la remoción no requerida.

Rastreo. Previo a la plantación y cuando el suelo es profundo y con pendientes menores al 25%, se recomienda dejar un paso superficial de rasta en la época de lluvias, para asegurar la supervivencia y desarrollo de las plantas.

Deshierbe. Al inicio de la plantación se debe deshierbar lo más posible el sitio, especialmente las gramíneas en el área cercana a la planta, para evitar problemas por competencia por humedad, nutrientes o luz.

Subsolado. Aplicar donde el suelo es demasiado somero.

Trazado. Se recomienda trazar el terreno en forma regular con espaciamientos de 2x3 m ente planta, utilizando los diseños de "tresbolillo" o "marco real".

Apertura de cepas. El método más común es el de cepa común.

Para el resto de las especies, de manera general:

Deshierbe. Si el terreno presenta problemas de malezas se recomienda realizar deshierbes manuales o mecánicos dependiendo de las condiciones del terreno. Si éste presenta pendientes mayores a 12% se recomienda, para evitar la erosión del suelo, remover la vegetación solamente en los sitios donde se sembrarán las plantas, franjas o alrededor de las cepas. Esta actividad podrá realizarse por medio de chapear la vegetación, con machetes, o retirarla manualmente.

Subsolado. Aplica solamente cuando se presentan capas endurecidas a escasa profundidad, ≤ 15 cm; siempre y cuando los terrenos presenten pendientes $\leq 10\%$ (5). Para el caso de siembra directa en campo el terreno debe aflojarse (pica y ploteo) a una profundidad mínima de 20 cm.

Apertura de cepas. El método más común es el de cepa común, la cual consiste en hacer una apertura de suelo de 40 cm de largo por 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, depositando a un lado de la cepa la tierra de los primeros 20 cm (es la tierra más fértil) y, en el otro lado, la tierra de los 20 cm más profundos.






Al momento de la plantación hay que tener las siguientes consideraciones:

1. Previo a la plantación, se recomienda hacer una poda de raíz si ésta es necesaria, recortando las puntas para evitar que se doblen y crezcan hacia arriba o en forma circular. Si se poda la raíz es necesario podar un poco el follaje lateral para compensar la pérdida de raíces y evitar la deshidratación de la planta en tanto se arraiga en el terreno.
2. Se quita el envase sin dañar la raíz (retirar el envase de plástico de la planta).
3. Antes de colocar la planta en la cepa, se agrega la tierra superficial (más fértil) para que la planta tenga mejor disposición de nutrientes. Primeramente, se agregará tierra suelta dentro de la cepa hasta calcular que el cepellón colocado quede con el cuello radicular del ejemplar al nivel del piso. Se evitará sofocar las raíces si el ejemplar queda muy abajo, pero si queda muy arriba las raíces se pueden morir o deshidratar, manteniendo el ejemplar en estrés permanente; el cuello radicular debe estar en un rango de 5 a 10 cm arriba, porque el suelo suelto bajará con el agua hasta quedar al nivel del piso.
4. Después de haber colocado la planta, se rellena con la tierra más profunda y se compacta la tierra de tal forma que no quede tan fuerte para permitir la aireación y drenaje en el suelo. Ya colocado y nivelado verticalmente el tallo, se agregará la tierra suelta todo alrededor sin compactarla y riego simultáneamente si es posible para que no queden bolsas de aire. Primeramente, se agregará tierra suelta dentro de la cepa hasta calcular que el cepellón colocado quede con el cuello radicular del ejemplar al nivel del piso. Se evitará sofocar las raíces si el ejemplar queda muy abajo, pero si queda muy arriba las raíces se pueden morir o deshidratar, manteniendo el ejemplar en estrés permanente; el cuello radicular debe estar en un rango de 5 a 10 cm arriba, porque el suelo suelto bajará con el agua hasta quedar al nivel del piso.
5. Se recomienda apisonar ligeramente el suelo para que no queden espacios de aire en la cepa y evitar la deshidratación de la raíz de la planta, ya que desde su extracción del vivero hasta la plantación está sujeta al estrés físico por el traslado. Ya colocado y nivelado verticalmente el tallo, se agregará la tierra suelta todo alrededor sin compactarla y riego simultáneamente si es posible para que no queden bolsas de aire.

8

En las siguientes figuras se describe la forma de plantación de plántulas bajo el sistema de cepa común:





Es conveniente colocar varias piedras a su alrededor, a fin de evitar que sea dañada por roedores, los que aprovechan lo blando del suelo para desenterrar las plantas, voltearlas y comerlas desde la base, burlando así la protección que, de manera natural, les proporcionan las espinas.

Obras de conservación de suelos

Zanja trinchera (tinas ciegas).


Son excavaciones en curvas a nivel de 0.40 metros de ancho x 0.40 metros de profundidad y 2 metros de longitud. Estas obras sirven para reducir la erosión hídrica. Interceptar los escurrimientos superficiales, incrementar la infiltración del agua de la lluvia y auxiliar en la reforestación en la sobrevivencia de especies vegetales.






Los beneficios que trae implementar estas zanjas es que retiene azolves, favorecen la mayor infiltración de agua, retienen y conservan humedad en áreas localizadas y favorecen el desarrollo de especies forestales y de vegetación natural.

Se debe procurar que el fondo de la zanja quede lo más plano posible el suelo cavado se coloca en la parte baja de donde se construye la zanja la distancia entre hilera de zanja depende del agua que se pueda captar según la vegetación inclinación tipo uso de suelo y la lluvia que caiga en la región. Es recomendable dejar un espacio entre cada zanja de 10 metros distribuidas en forma de triángulo para captar la mayor cantidad de agua que escurre en todas las áreas



Zanja trinchera (tina ciega)



Distribución de zanja trinchera en tres bolillo

Se puede plantar una o dos plántulas por zanja para bríndales mejores condiciones de humedad y ayudarles en su desarrollo, estas obras pueden funcionar hasta por 5 años, pero si las especies que se planten son de lento crecimiento basta con desazolvar las zanjas retirando la tierra del fondo de la misma. Capturan de 35% al 50% de escurrimiento generado por la precipitación pluvial.


Su apertura debe realizarse entre los meses de enero a junio para que al inicio de la temporada fluvial puedan cargarse de agua y comenzar con su función de infiltración y de esta manera recargar los mantos freáticos que corren por debajo.

Acciones para el mantenimiento y sobrevivencia

El objetivo de esta actividad es evitar la destrucción o daño de la reforestación por posibles agentes que pueden ser controlados por el hombre.

Es importante precisar que el proceso de la reforestación no termina al momento de concluir la plantación, pues la totalidad de las plantas puede morir si no se establecen medidas adecuadas de protección y mantenimiento.





En este sentido, primero se debe identificar el posible agente causal del daño a la reforestación, y proceder a implementar la protección específica y adecuada al área reforestada, considerando su oportunidad, los materiales a utilizar, la participación de los responsables de la plantación y factores extremos.

1.- Protección contra animales. Se pueden considerar tres tipos de protección de acuerdo con el tamaño de los animales:

- **Animales de porte mayor:** Se refiere al ganado vacuno, equino y a todo tipo de animales que se pueda controlar con un cercado de tres a cuatro líneas de alambre. El daño que provocan a las plantas es por pisoteo de las plantas, además de que compactan el suelo impidiendo la correcta oxigenación de las raíces y el paso del agua.
- **Animales de porte medio:** Incluye el ganado ovino, sobre todo el caprino, que causa más daños a las plantaciones por su enorme capacidad digestiva y su dieta multi específica. El costo que implica la protección contra este tipo de animales en relación al anterior es mayor, debido a que se requiere un sistema de cercado diferente para poder proteger la plantación. Se puede emplear el cerco con alambre con los hilos más juntos (15 centímetros cada uno) o el cerco con malla ciclónica.
- **Animales de porte bajo:** Abarca todo tipo de animales silvestres como conejos, liebres, ciervos, tuzas y algunas especies de aves, entre otros. Para impedir el acceso de éstos al área reforestada, se pueden construir murallas de piedra o colocar cercos con malla ciclónica o borreguera.

2.- Manejo integrado de plagas y enfermedades. Diversos agentes patógenos pueden afectar una o más partes de los árboles, dando como resultado la reducción del crecimiento o, en casos severos, la muerte del arbolado. Por este motivo es importante implementar acciones de prevención, y en su caso de control, para reducir sus efectos. El manejo integrado de plagas consiste en una estrategia que combina diversas acciones para tratar de reducir el uso de agroquímicos, disminuyendo así los efectos negativos para el ambiente y la salud humana.

♦ **Detección de plagas y enfermedades:** La detección de plagas y enfermedades se realiza mediante monitoreos continuos, que implica la realización de recorridos en campo o sitios donde se establecerá la reforestación. No hay que olvidar que para que una planta se establezca favorablemente en campo, debe salir libre de plagas y enfermedades del vivero de procedencia.

a) Medidas preventivas:

Medidas preventivas		
El manejo integrado de plagas y enfermedades en la reforestación inicia con la implementación de acciones que prevengan y eviten, en la medida de lo posible, la aparición de patógenos que afecten el buen desarrollo de la misma.		
Aislamiento:	Eliminación de hospederos	Canales de drenaje:






	alternos	
Consiste en delimitar con barreras físicas una o varias partes de la plantación con el fin de evitar la dispersión de la plaga o enfermedad, restringiendo el tráfico de personal y vehículos en esa área.	Se trata de la eliminación de plantas dentro del sembradío y sus alrededores que pueden ser hospederas alternas de plagas o enfermedades.	La construcción de canales de drenaje evita la anegación de las zonas bajas de la plantación, dificultando así el desarrollo de plagas o enfermedades.

b) Medidas de control

Medidas de control:			
Una vez que se identifican las plagas o enfermedades que afectan a la plantación, se pueden emplear diversos métodos para su control y combate.			
Remoción y destrucción manual	Control mecánico y físico	Control biológico	Control químico
<p>Cuando se encuentre la presencia de insectos que pupen en ramas, corteza o suelo, es necesario hacer la remoción manual de las pupas y destruirlas en el sitio para cortar el ciclo del insecto.</p>	<p>Tala de salvamento: Consiste en la eliminación total del arbolado en una o más áreas de la plantación con el fin de erradicar la plaga o enfermedad en un área determinada, éstas se denominadas focos de infección debido a su condición. Los árboles derribados y el material secundario (ramas y ramillas) se deben de tratar en el sitio</p> <p>Raleo sanitario: Es el derribo de árboles aislados dentro de la plantación que están afectados severamente y cuya condición no puede revertirse</p> <p>Poda sanitaria: Es la remoción de una o más partes del árbol que han sido severamente afectadas por plagas o enfermedades. La remoción se efectúa por medio de podas</p>	<p>Control por conservación: Consiste en conservar y promover la sobrevivencia y reproducción de los enemigos naturales nativos presentes en la plantación, con el fin de ampliar su impacto sobre las plagas.</p> <p>Control biológico clásico: Consiste en la introducción y establecimiento de nuevas especies de enemigos naturales altamente específicas para el control de las plagas en la plantación.</p>	<p>Plagas y enfermedades se controlan por medio de sustancias químicas o biológicas.</p>

3.-Incendios. El peligro de incendios es un factor de alta consideración en materia de reforestación. Para minimizar riesgos es necesario implementar acciones preventivas y, en el caso de registrarse un incendio, se





deben emplear las técnicas de combate más apropiadas de acuerdo con las herramientas y personas disponibles, así como la peligrosidad del mismo.

Prácticas para la prevención de incendios:

- ♦ **Apertura de brechas cortafuego:** Consiste en abrir líneas o franjas de dos a tres metros de ancho, dependiendo de las condiciones del terreno y el objetivo de la práctica. Con la apertura de las brechas se busca eliminar todo el material combustible que se encuentre en las zonas críticas de la plantación para evitar que pueda provocar un incendio. Con este trabajo se logra aislar y proteger las áreas reforestadas.
- ♦ **Rehabilitación de brechas corta fuego:** Una vez que se tienen las brechas corta fuego, es importante rehabilitarlas cada año, eliminando todo el material que pueda convertirse en combustible y dañar la reforestación en caso de incendio. Conviene no esperar a que la brecha haya sido cubierta en su totalidad.

Para proteger la reforestación se debe considerar la elaboración y colocación de rótulos en los límites del área de plantación, sobre todo donde los caminos llegan al sitio. Dichos rótulos deben incluir la información básica, como superficie plantada, especies utilizadas, año de establecimiento, dependencias responsables y advertencias de lo que no está permitido hacer dentro del área y a quién debe reportarse las irregularidades o emergencias. Los rótulos deben elaborarse con material durable y la pintura debe ser resistente a las condiciones climáticas.

13

4.- Mantenimiento de la reforestación: En esta etapa se realizan diversas acciones para favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas. Se recomienda que las actividades de mantenimiento se realicen por lo menos hasta el quinto año de haber sido establecida la reforestación, para asegurar su permanencia

- ♦ **Control de maleza:** El control de la maleza consiste en eliminar toda vegetación indeseable que limite su desarrollo.
- ♦ **Reposición de planta muerta:** Para mantener la densidad definida de la plantación es necesario reponer las plantas muertas en cada ciclo de lluvias.

Programa de actividades

El siguiente cronograma se plantean las actividades de rescate y reubicación de especies (plantación), la etapa de mantenimiento se efectuará y aplicará para los siguientes cuatro años, con la finalidad de que este tiempo se logre el 80% de sobrevivencia de la plantación.

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rescate de especies de flora y fauna silvestre ¹												
Reubicación de las especies de flora y fauna												





Plantación																					
Aplicación de Fertilizantes																					
Aplicación de Riegos ²																					
Mantenimiento																					
Control de Malezas																					
Reposición de planta nueva ³																					
Aplicación de fertilizante a las plantas repuestas ⁴																					
Evaluación de la plantación ⁵																					
Informes de avances y resultados																					

Evaluación de la reforestación

Monitoreo

Para la flora el monitoreo se hará de forma general para las especies reubicadas, tiene como finalidad evaluar a corto y mediano plazo el éxito de la reubicación y la eficacia de las técnicas empleadas. Este monitoreo se llevará a cabo, el mes siguiente de haber reubicado a los ejemplares; el periodo de monitoreo será mensual durante el primer año posterior al rescate de flora. El personal capacitado para esta actividad determinará si se requiere ajustar su duración.

El monitoreo de las plantas en el vivero temporal contribuirá a mantener vigiladas las plantas rescatadas y la ejecución de acciones inmediatas para evitar su muerte.

En cuanto a la fauna posterior a la liberación de los ejemplares rescatados y reubicados, se realizarán monitoreos con énfasis en los grupos de, reptiles, mamíferos pequeños y medianos de poca movilidad que previamente fueron marcados durante su captura, con el objetivo de determinar la supervivencia y con ello el éxito de la reubicación. Para ello, se utilizará el método de captura y recaptura el cual consiste en la captura constante de una parte de la población, por medio de trampas. Los individuos liberados son identificados por medio del marcaje que se realizó para estimar la supervivencia de los mismos. Es importante determinar el número de individuos que se reproducen en el año para estimar la adaptación de la población a su nuevo ambiente.

El monitoreo del grupo de reptiles deberá realizarse a los 15 y 30 días después de su reubicación, debido a que mudan de piel y si el marcaje es por escamas desaparecerá rápidamente. El monitoreo de anfibios, de igual manera, deberá realizarse a los 15 y 30 días después de su liberación en el nuevo sitio. El monitoreo de mamíferos





pequeños y medianos, deberá realizarse a los 30 y 60 días después de su liberación, con el objetivo de abarcar la temporada de reproducción y evaluar su adaptación.

Evaluación y seguimiento

Dependiendo de cuál es la variable de interés, será la etapa adecuada para realizar la evaluación. Si lo que se busca es evaluar la sobrevivencia, se requiere efectuarla después del primer periodo de sequía. Además de la sobrevivencia, se pueden obtener diferentes variables al momento de la toma de datos en campo, como estado sanitario y vigor de la planta.

- ◆ **Estimación de la sobrevivencia:** Esta tarea permite tener una estimación cuantitativa del éxito de la plantación bajo la influencia de los factores del sitio. El valor que se obtiene es la proporción de árboles que están vivos en relación con los árboles efectivamente plantados. Para obtener la sobrevivencia de la plantación se extrapolan los datos de la superficie de muestreo a la totalidad de la plantación.
- ◆ **Evaluación del estado sanitario:** Permite conocer la proporción de árboles sanos respecto a los árboles vivos en la plantación. Se considera que un individuo está sano cuando no presenta daños por plagas o síntomas de enfermedades en cualquiera de sus estructuras.
- ◆ **Estimación del vigor de la plantación:** Describe la proporción de órganos vigorosos del total de los árboles vivos. El vigor se clasifica de la siguiente forma: bueno, cuando la planta presenta un follaje denso, color verde intenso y tiene amplia cobertura de copa; regular, cuando el árbol muestra un follaje menos denso, color verde seco a amarillento y follaje medio; malo, cuando el follaje es amarillento, ralo y de hojas débiles.

15

a) Sobrevivencia

La metodología a utilizar para evaluar sobrevivencia será por el método del punto fijo o parcela cero fija. Consiste en evaluar sitios a los que usualmente se les denomina parcelas. En cada parcela se evalúan variables como el crecimiento en diámetro, altura, producción de brotes, a dichas parcelas se les considera puntos fijos. La idea del procedimiento es que un examen repetido de estas muestras proporcionará resultados confiables sobre la variable de interés, que para el caso de la sobrevivencia resulta ser el número de plantas reintroducidas.

◆ Muestreo

El procedimiento de selección de la parcela será aleatorio, por lo que será posible realizar un análisis estadístico de los resultados (Análisis de varianza), calculando estimadores puntuales como los ya mencionados en los intervalos requeridos para las plantas estandarizando así los sitios de muestreo.

Sin embargo, se utilizarán sitios con formas similares fáciles de distinguir en campo. Las parcelas estarán dispuestas según las variantes del relieve, distribuyendo de forma aleatoria en cada tipo de relieve: lomerío suave, lomerío pronunciado, zonas con mayor planicie.





La sobrevivencia se expresará como el porcentaje del número total de puntos de muestra ocupados por las plantas, en función de una unidad común; la superficie.

Las comparaciones con las parcelas control se efectuarán mediante un análisis estadístico de comparación de medias (Varianza de la sobrevivencia). Obteniendo como resultado final la determinación de diferencias significativas en cuando a la sobrevivencia y crecimiento, bajo las condiciones de la restauración del suelo en el predio en comparación con parcelas o transectos control sembradas a la par en suelos estables en la microcuenca

Si p_j es el porcentaje de sobrevivencia de la j -**enésima** hilera, entonces el porcentaje de sobrevivencia promedio (p) puede ser estimado como:

$$P = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n P_j$$

Donde n es el número total de Grupos; por lo que en ejemplo sería

$$P = \text{Sobrevivencia} = \frac{664}{8} = 83\%$$

La Varianza S^2_p de sobrevivencia de (P) se puede estimar como

$$s^2_p = \frac{\sum_{j=1}^n p_j^2 - \left(\frac{\sum_{j=1}^n p_j}{n}\right)^2}{(n-1)}$$

También se puede calcular el valor del error estándar del porcentaje de sobrevivencia promedio (p) de la siguiente forma:

$$s_p = \sqrt{\frac{S^2_p}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right)}$$

b) Estado sanitario

Permite conocer la proporción de árboles sanos respecto a los árboles vivos en la plantación. Se considera que un individuo está sano cuando no presenta daños por plagas o síntomas de enfermedades en cualquiera de sus estructuras.

$$ps = \frac{\sum_{i=1}^n Si}{\sum_{i=1}^n ai} \times 100$$

Donde:

$\sum_{i=1}^n$ = sumatoria de los datos de acuerdo a la variable S o a

Sabinos 402, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C. P. 68050

www.gob.mx/seamamat



ps= proporción estimada de árboles sanos

Si= número de árboles sanos en el sitio de muestreo i

ai= número de árboles vivos en el sitio de muestreo i

c) Crecimiento

El objetivo de evaluar el crecimiento de la plantación es definir su dinámica de desarrollo, así como su probable rendimiento a una edad o fecha determinada. Es común que la información que se va a capturar se registre de acuerdo a un formato común. Por tal razón a continuación se señalan algunas definiciones de las variables a utilizar:

Diámetro (DN) es el diámetro medido en la parte media del tallo. Se recomienda que su evaluación se haga con aproximación a milímetro. Toda vez que es el incremento medio anual que se registran para esta especie.

Altura (H) Es la altura total de la planta medida desde la base hasta el ápice. Se recomienda codificarla en metros con aproximación a centímetro. En el caso del presente proyecto se recomienda usar estadales graduados para facilitar la estimación de la altura.

Sanidad (S) La sanidad se refiere al estado fitosanitario de la planta que se está evaluando.

17

Informe de avances y resultados

Estos datos se reportarán en una bitácora de obra la cual formara parte de los informes de reforestación los cuales se realizarán semestralmente.

Formato propuesto para Bitácora:

- ◆ Nombre del proyecto:
- ◆ Ubicación:
- ◆ Número de autorización:
- ◆ Periodo:
- ◆ Personal ambiental: será el contratado por el Promovente
- ◆ Número de etapa según corresponda

En las siguientes tablas se propone el siguiente formato los cuales se rellenarán cuando se realice la evolución correspondiente, los mismos que se anexarán a la bitácora.





Con los datos anteriores se realizará el cálculo para poder conocer las condiciones y el porcentaje de

Predio/ Localidad	Especie	Estado fisiológico		Estado sanitario	Datos dasométricos		Reposición	Recajeteo	Método de combate
		Viva/muerta	Vigor		Diámetro de base	altura			

sobrevivencia de la plantación.

Sitios	Plantas totales por sitio	Árboles totales vivos/ periodo			
		Periodo	Árboles vivos	Árboles muertos	% sobrevivencia

Fauna

En cuanto a la fauna se considerarán todas las especies que se encuentren ubicadas dentro del área destinada a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. De igual manera se debe considerar que pueden aparecer otras especies no registradas durante el muestreo por lo tanto todas las especies serán rescatadas y reubicadas o en su caso ahuyentadas (aves).

Rescate

Para efectuar el rescate y reubicación de la fauna silvestre, a continuación, se describen las técnicas a realizar. Cabe destacar que como se menciona en el capítulo IV, solo se registraron ejemplares del grupo aves; sin embargo, se mencionan técnicas de rescate y reubicación para el resto de los grupos faunísticos, para poder aplicar en caso de encontrarse alguna especie perteneciente a éstos.

Especies que tienen lento desplazamiento el rescate se realizará manualmente, para las lagartijas la captura se realizará manualmente, en el caso de los nidos de las aves se recolectarán para su posterior reubicación, la captura de las serpientes se realizará con el uso de ganchos herpetológicos, para mamíferos de pequeña y mediana talla se aplicará el uso de trampas Sherman y Tomahawk, en el caso de aves con baja capacidad de desplazamiento se utilizarán redes ornitológicas. Se debe de considerar que el rescate se realizará después de la época de reproducción de la mayoría de las especies, esto como consecuencia de evitar el abandono de camadas y nidos. Una vez capturados los individuos, se procederá a su reubicación en áreas aledañas al área de influencia del proyecto que presenten condiciones ecológicas similares.

Se utilizarán técnicas de ahuyentamiento, las cuales estarán encaminadas sobre todo al desplazamiento de especies de aves, murciélagos y mamíferos de hábitos cursoriales.



Las técnicas de ahuyentamiento a utilizar estarán basadas en la generación de ruidos intensos mediante el empleo de sirenas de diferentes frecuencias, en distintas áreas y horas del día, con el objetivo de ahuyentar tanto a aves, como a murciélagos y mamíferos de mediana y gran talla.

Cabe mencionar que en caso de registrarse individuos pertenecientes a otros grupos (mamíferos, anfibio) se realizara igual el rescate y reubicación de los mismos.

Mamíferos

Se realizará una actividad de ahuyentamiento tanto en las horas del día como de la noche, sin embargo, se tendrá una mayor dedicación durante la última. Consecuentemente se debe realizar una actividad de ahuyentamiento por la mañana entre las 7:00 y las 9:00 y otra en la tarde entre las 16:00 y 00:00 horas, los mamíferos en general responden de forma positiva a estímulos visuales, auditivos y mecánicos.

Se recomienda implementar las siguientes técnicas:

- 1 Siluetas
- 2 Sonido
- 3 Trampas Sherman
- 4 Trampas Tomahawk
- 5 Trampas pozo
- 6 Captura manual

Las trampas Tomahawk, son trampas que pueden ser utilizadas para la captura de mamíferos de tamaño mediano como: mapaches, tlacuaches, ardillas, conejos, liebres y zorras. El cebo que se coloca adentro varía dependiendo de la especie que se pretende capturar, para ello es necesario conocer los hábitos de cada una. Usualmente se utiliza fruta picada, carne, semillas, sardina o atún en aceite, etc. Se debe colocar en el suelo y, si se conoce la entrada de la madriguera o los caminos de paso de las especies blanco, es mejor colocarlas directamente cortando el paso. Además, se debe amarrar la trampa a un árbol o una roca para evitar que el animal dentro pueda moverla.

Para el caso de los mamíferos pequeños se usan las trampas tipo Sherman, las cuales se colocan en hileras separadas cada 5 m para completar transectos de 40 trampas. El cebo que se utiliza puede ser avena con gotas de vainilla y crema de cacahuete. Dado que se pretende capturar el mayor número de ejemplares posible, es necesario que las trampas se coloquen en sitios cerca de madrigueras, junto a escalones naturales que funcionan como paredes y son utilizados para el tránsito de roedores y musarañas. Una vez instaladas, deben revisarse frecuentemente, por lo menos una vez cada 24 horas y más frecuentemente en climas calurosos o de frío intenso (si es necesario, es recomendable colocar papel periódico o algodón dentro de las trampas para disminuir la incidencia de muerte por frío).

La tasa de mortalidad de las musarañas durante la captura es muy alta, debido a su rápido metabolismo, por lo que pocas veces se logra encontrar un individuo con vida al momento de revisar las trampas. Se sugiere que el





cebo utilizado esté compuesto por avena, vainilla y crema de cacahuete, con el objetivo de que sean atraídos también insectos que sirvan de alimento para las musarañas capturadas. En caso de coleccionar un ejemplar vivo se podrá mantener con lombrices y escarabajos hasta su liberación.

Todos los ejemplares capturados deberán ser marcados enumerados para su posterior identificación en el monitoreo. Se registrarán los datos de especie, edad, sexo, longitud total, longitud de la cola, longitud de la pata, longitud de la oreja, condición general del individuo y tipo de vegetación en el que se capturó.

Reptiles

Los anfibios y reptiles tienen por lo regular un solo pico de actividad por día. En general son animales de comportamiento nocturno debido a que no toleran las altas temperaturas. Por su parte, dentro de los reptiles, existen especies que son diurnas mientras que hay otro porcentaje que es estrictamente nocturno. Por esta razón se debe realizar una actividad de ahuyentamiento en las primeras horas de la mañana, entre las 6:30 y las 10:00 y otra por la tarde, entre las 18:00 y las 22:00 horas

Los anfibios y reptiles en general responden de forma positiva a estímulos auditivos y mecánicos. Se recomienda implementar las siguientes técnicas:

1 Siluetas

2 Sonidos

3 Trampas pozo

4 Captura manual:

Las lagartijas pequeñas, así como algunas especies arborícolas o subterráneas podrán ser atrapadas manualmente. La captura de las especies más difíciles de recolectar se hace generalmente con un lazo en la punta de una varita. El largo de ésta varita varía de acuerdo con la especie de lagartija, aunque en general va de 1.8 a 2 m de largo (vara herpetológica).

El lazo debe ser de nylon o de seda para que quede bien abierto y tenga una circunferencia de más o menos el doble de la cabeza del animal. La captura se realiza acercando lentamente la vara, paralela al cuerpo de la lagartija y por encima, de atrás hacia adelante, se hace entrar el lazo hasta el pescuezo y se da un jalón para arriba y hacia atrás.

Si se trata de una serpiente, se deberá tratar siempre como si fuese venenosa, aunque ésta no lo sea. No se le debe tomar por la cola ni agarrarle directamente, se deben usar unas pinzas grandes y se toma al ejemplar del cuello o usando un gancho herpetológico para evitar ser mordido.

Si se trata de lagartijas de tamaño mediano se debe procurar no acercar las manos a la boca del ejemplar y se debe manipularla con cuidado. Todas las especies de reptiles deberán ser colocadas en costales de tela resistentes pero a la vez porosos; la manta suele funcionar siempre y cuando se asegure que no haya orificios en los costales y que el tamaño de los mismos sea proporcional al tamaño del animal.



Todos los ejemplares capturados deberán ser marcados para su posterior identificación en el monitoreo. Los anfibios serán marcados con el método de corte de falanges siguiendo la enumeración estándar. En este caso se asigna una codificación a cada falange y se corta solamente la punta de las mismas, de manera que la locomoción del individuo no se vea afectada.

Los reptiles pueden ser marcados por medio de pequeñas incisiones o perforaciones en las escamas. Mediante esta técnica se puede marcar un gran número de organismos de manera sencilla. Sin embargo, también puede utilizarse el método de corte de falanges en patas y manos en este grupo, utilizando la misma codificación. Las serpientes deben ser marcadas mediante el corte de escamas ventrales en sentido ascendente desde la abertura de la cloaca hacia la cabeza.

Para cada individuo se registrarán los datos de especie, localidad, fecha, hora de captura, tipo de vegetación, microhábitat, número de marca, peso, sexo y datos biométricos de acuerdo a la especie.

Con el fin de tener un registro confiable de las especies de animales rescatadas, se deberá llenar una ficha de campo por cada organismo capturado.

Aves

Se debe tratar en lo posible que las aves abandonen el área que se va a intervenir por sus propios medios y no mediante captura y reubicación

Solo se capturarán individuos cuyo comportamiento territorial esté causando que el individuo no abandone el área que se desea intervenir. Si este es el caso, los individuos deberán ser capturados utilizando redes de niebla y la manipulación de este deberá ser ejecutada por el ornitólogo.

Las aves tienen dos picos de actividad, uno en la mañana y otro en la tarde. En las horas de la mañana, el pico de actividad de las aves ha sido registrado desde la salida del sol hasta cuatro horas después, es decir, desde las 5:30 hasta las 9:30 horas. En la tarde, el pico de actividad de las aves se ha registrado como tres horas antes del ocaso, es decir desde las 13:00 hasta las 18:00 horas. Estos son los momentos en los que se debe realizar la actividad de ahuyentamiento.

Las aves en general responden de forma positiva a estímulos visuales, auditivos, y mecánicos. Se recomienda implementar las siguientes técnicas:

1 Siluetas

2 Cintas de papel metalizado

3 Sonido

4 Redes de niebla (captura)

La efectividad de la captura dependerá del uso adecuado de las técnicas propuestas, los horarios en los que se instalen las trampas y redes y la destreza visual que posean los profesionales de campo





Reubicación

Considerando lo descrito anteriormente en cuanto a las técnicas de rescate de especies tanto florísticas como faunísticas. A continuación, se describen las técnicas para realizar la reubicación.

Antes de considerar las técnicas de reubicación o liberación se deben de considerar las técnicas de traslado, las cuales se describen a continuación.

- A las especies de reptiles se les deberá transportar en costales de manta bien cerrados.
- El resto de los reptiles, si fueran muy grandes, deberán transportarse en recipientes de plástico sellados pero con orificios para que el aire pase fácilmente.
- Los mamíferos serán transportados directamente en las trampas donde han sido atrapados sin retirarlos de las mismas. Es importante que las trampas no estén expuestas directamente al sol o a condiciones de luz extrema, calor o frío. Tampoco es recomendable que los mamíferos capturados permanezcan mucho tiempo dentro de las mismas. Las trampas tanto "Sherman" como "Tomahawk" deberán estar cubiertas con alguna tela oscura para minimizar el estrés en el animal y sólo se destaparán para fines de identificación y liberación.

Liberación

Antes de ser liberados, habrá que asegurarse que los animales capturados se encuentren sanos y en buenas condiciones. Si alguno de los animales mostrara signos de debilidad o enfermedad será necesario que sea revisado. De ser necesario se proporcionará agua a los ejemplares antes de la liberación. Se deberá tratar de determinar la especie a la que pertenece o bien fotografiar el ejemplar, en el caso en que se desconozca su identidad específica.

Para los mamíferos en general será necesario que su liberación sea durante el crepúsculo o en la noche, cualquiera que sea la especie en cuestión. Los roedores generalmente requieren de estar en movimiento debido a su elevado metabolismo, por lo que se sugiere que sean liberados de forma rápida y eficaz. Debido a que las trampas son metálicas, éstas no se deben exponer al sol o al calor porque podrían ocasionar la muerte de los ejemplares. La apertura de las trampas debe realizarse con sumo cuidado y utilizando siempre guantes de carnaza.

En cuanto a los reptiles, este grupo es relativamente sencillo de manipular y de liberar, exceptuando las serpientes, las cuales se sugiere que sean manipuladas siempre por un experto. En general, las lagartijas son especies cuyos hábitos son diurnos, por lo que deberán ser liberadas durante el día, nunca en la noche. En su relocalización sólo se deberá desatar el nudo del costal, colocarlo al nivel del suelo y moverlo un poco para que el animal salga solo.

Seguimiento

En cuanto a la fauna posterior a la liberación de los ejemplares rescatados y reubicados, se realizarán monitoreos con énfasis en los grupos de reptiles, mamíferos pequeños y medianos de poca movilidad que previamente fueron marcados durante su captura, con el objetivo de determinar la sobrevivencia y con ello el éxito de la reubicación. Para ello, se utilizará el método de captura y recaptura el cual consiste en la captura constante de una parte de la población, por medio de trampas. Los individuos liberados son identificados por medio del





marcaje que se realizó para estimar la supervivencia de los mismos. Es importante determinar el número de individuos que se reproducen en el año para estimar la adaptación de la población a su nuevo ambiente.

El monitoreo del grupo de reptiles deberá realizarse a los 15 y 30 días después de su reubicación, debido a que mudan de piel y si el marcaje es por escamas desaparecerá rápidamente. El monitoreo de anfibios, de igual manera, deberá realizarse a los 15 y 30 días después de su liberación en el nuevo sitio. El monitoreo de mamíferos pequeños y medianos, deberá realizarse a los 30 y 60 días después de su liberación, con el objetivo de abarcar la temporada de reproducción y evaluar su adaptación.



